



PROPOSITIO-
nes reliquorum Libro-
rum Geometriæ Euclidis, Græ-
tè, & Latinè, in vsum eorum,
qui volumine Eucli-
dis carent.

*Per Cunradum Dasypodium, scholæ
Argentinenſis profefſorem.*



ARGENTORATI APVD
Christianum Mylium.
M. D. LXIII.



ILLVSTRISSIMO
PRINCIPI, ET DOMI-
NO, DOMINO NICOLAO
CHRISTOPHERO RADZEVVIL, DV-
CI OLICAE ET NIESVVISI, COMITI
IN SCHIDLOVVIEZ, &c. PRAECLA-
rae indolis, & optimae spei Principi, ac
Domino suo clementiff: S. D.
Conradus Dasypodius.



Vplicem finem, Illustriff:
Princeps, sibi in his Ele-
mentis proposuit Eucli-
des: alterū quidem vt illas
solidas figuras, ex quibus Platonis iu-
dicio, mundus hic suas habet descri-
ptas partes, traderet & explicaret; al-
terum verò, vt discantis animum ad
quæuis Mathematica percipienda o-
mnibus modis informaret, & erudi-
ret. idcirco primum de simplicissimis
quibusq; rebus geometricis agit: de-
inde sensim κατὰ συνθεσιν progreditur
ad magis composita: deniq; eo perue-
nit,

P R Æ F A T I O .

nit, vt omnis aperiatur figurarum simplicitium varietas, & copia, separatim quidem vnamquamq; prius constituendo: deinde eius proprietates & affectiones, quas cum per se, tum ad alias illæ habent examinando, tandem simul omnes vni eidemq; globo includendo, adhæc exponit omnes proportionés, quas lineæ ad lineas, anguli ad angulos, superficies ad superficies, corpora ad corpora habere compertum est, atq; hinc videmus; Euclidem suum assecutum esse finem, quem sibi in rerum geometricarum copia, & varietate explicanda proposuerat. Quantum verò ad illud, quod discantis animus his elementis geometricis erudiri diximus, ita intelligendum est: quod quicumq; his diligenter incumbit, ita tandem intelligentia animum imbuat suum: & quasi harum rerum habitum sibi comparat: vt eo facilius ad quamuis Geometricam tractationem

nem

PRÆFATIO.

nem sibi ipsi sufficiat, cum enim ab his tanquam initijs incipimus: cæterarum omnium huius scientiæ partium cognitionem assequi, rerumq; geometricarum varietatem percipere poterimus, neq; id tantum, quin & illud verissimè dici potest sine iisdem illis elementis reliquorum omnium non obscuram tantum, sed penitus nullam esse intelligentiam. Sicuti enim nullus neq; Poëtarum, neq; Rhetorum, aut Dialecticorum, aut alterius cuiusq; auctoris scripta intelliget; nisi prius grammaticorum teneat elementa: sic etiam in his disciplinis Mathematicis certa quædam sunt elementa, sine quibus reliqua percipi nequeunt. Eiusmodi Euclides noster simplicissima habet theoremata, & quæ primis hypothesebus sunt proxima, eaq; in hos congestit libros, tam eleganti ordine, & tam apta collocatione, vt verè dicere possimus, in nulla re ordinem convenien-

PRÆFATIO.

tiorem ostendi posse. His autem elementis reliqui vtuntur mathematici: ad confirmanda suarum demonstrationum fundamenta: ex quorum numero precipue sunt Archimedes Syracusanus, Apollonius Pergæus, & cæteri non Geometræ solum, sed & Astronomi, Theodosius Tripolites, Ptolemæus Alexandrinus, & quicumque mathematicorum nomen tueri possunt. Euclidis igitur lectio non tantum ad elementorum cognitionem utilis & necessaria est, quæ in eodem genere sunt scripta, & γεωμετρικὰ, aut ἐκ γωνιᾶ τῆ γεωμετρίας sunt: sed & ad quamuis mathematicam scientiam & disciplinam percipiendam, vnde ex hac εἰσχειώσῃ, tanquam ex vrbe aliqua populosa, plurimæ deductæ sunt coloniæ. Nunc itaque satis sit dictum de fine Elementorum geometricorum, qui in eo consistit, vt discentes absolutam sibi comparent rerum mathematicarum cognitionem, & vt

PRÆFATIO.

& vt figurarum proprietates, & differ-
 entias omnes intelligamus : eaq̃ om-
 nia ad mundi vniuersi, eiusq̃ partium
 contemplationem accommodemus. Sed
 dicat aliquis, quonā modo hæc accom-
 modatio intelligenda est: aut quæ est
 illa conuenientia figurarum Geome-
 tricarum cum mundi partibus: id pau-
 cis sic percipite. Geometræ quinque
 habent solidas figuras, quas nominant
 corpora regularia, vt sunt *πύραμις*, *ὀκ-
 τάεδρον*, *εἰκοσάεδρον*, *κύβητος*, *δωδεκάεδρον*:
 Astronomi, & Physici, cœlum, &
 quatuor elemēta, ignem, aërem, aquā,
 & terram: iam si figuras has cum mun-
 do, eiusq̃ partibus conferas : tum ἀνα-
 λογία quadam *πύραμις* igni conuenit,
 propter eius cum acumine ignis simi-
 litudinem. *ὀκτάεδρον* aëri : sicut enim
 aër igni, ita *ὀκτάεδρον* *πυράμιδι* leuita-
 te formæque proximum est : eodem
 modo *εἰκοσάεδρον* potest aquæ compa-
 rari, propter mobilitatem, qua talis fi-

PRÆFATIO.

gura huic elemento est consimilis: terræ etiam cubus assimilatur, propter stabilitatem, & huius corporis firmam plenitudinem. denique cœlo comparât *δωδεκάεδρον*. quemadmodum enim cœlum duodecim signis zodiaci cingitur: ita duodecim habet bases dodecaedron quibus consistit: item, sicut cœlum suo ambitu reliqua in se comprehendit elementa, ita dodecaedron inter quinque ista corpora regularia, quæ in eandem includi possunt sphaeram, omnium est maximum, & quod reliqua omnium aptissime circumscribit. Quare hæc est Platoniorum accommodatio figurarum geometricarum ad mundi partes: quam cum Euclides, qui & ipse Platonicus fuit, optime nosset, eò etiam in suis respexit elementis, etsi priora essent cogitatione: tamen in elementorum contextu facta sunt posteriora. præmittenda enim erant ea, sine quibus hæc percipere non possumus,

P R Æ F A T I O.

mus, quod facile ἀναλυτικῶς demonstrabimus, hæ figuræ superficiebus equalibus, lateribus etiam & angulis æqualibus continētur, & eidem spheræ includuntur: quod quidem qua ratione fiat, nec sciri, nec intelligi poterat: nisi prius ostēderetur, quanto diameter spheræ longior esset vnoquoque latere vnuscuiusque figuræ, cum verò necque illud absque cognitione rationalitatis, & irrationalitatis linearum, & superficierum percipi posset: libro decimo de linearum συμμετρία, & ἀσυμμετρία tradit: atque hæc tractatio requirebat cognitionem numerorum, sine qua sane nihil poterat intelligi. itaque quantum satis erat in elementis, & quantum sufficiebat ad hoc negotium, tribus libris nono, octauo, & septimo diligentissime omnia persequitur. quia verò simplicitate circulorum, & figurarum rectilinearum doctrina prior erat, & solidorum corporum cognitio ex hac

PRÆFATIO.

demanat : sex libris prioribus suæ σοι-
χειώσεως tradit γεωμετρικὰ : & demon-
strat, quæ quibus sint æqualia, quæ in-
æqualia, quæ proportionem habeant
aliquam, quæ minus, quæ similia, quæ
verò dissimilia: denic̄ omnem rerum
geometricarum persequitur varieta-
tem. Ex his arbitror quemuis facile vi-
dere, non solum quæ & qualis sit illa
geometrarū methodus, sed & quid in
his contineatur elementis : eaq̄ paulò
prolixius explicare volui, quia adole-
scentibus harum rerum imperitis hæc
scribo, vt quasi per transennam con-
spiciant totam οἰκονομίαν τῶν γεωμετρι-
κῶν λόγων. vt inde utilitatem videre,
τάξιν admirari; subtilitatē perspicere:
denic̄ singulare ingenij acumen eius,
qui hæc conscripsit, suspicere possint.
Quare vt in duobus prioribus libellis
quos in lucē edidi, bonos adolescentes
adhortatus sum ad studium Geome-
triæ, ita & hoc in loco faciam, & sem-
per fa-

PRÆFATIO.

per facturum sum : cum sciam quàm vtile , & quàm necessarium sit hæc percipisse. Verum ne hortator solum, sed & adiutor essem: volui in gratiam studiosorum propositiones reliquorum Euclidis librorum Græcè & Latine edere: eo sane cōsilio, quòd cogitarem, mutilatum quippiam esse, si primus & secundus liber tantum imprimeretur, reliquis omisis. inde enim fieret, vt contextus, & συνέχεια harum propositionum percipi nō possit. deinde quia sæpenumero in meis accidit prælectionibus, vt mentionem faciam nunc huius, nunc illius Euclidæ propositionis, cumq; illis destituantur mei discipuli: quomodo quæ doceo percipiant non video, nisi magna cum difficultate: & meo quidem iudicio nihil aliud est, quàm obscura obscurioribus velle explicare. adhæc eò respexi etiam, vt cum hæc sint mathematicarum disciplinarum elementa, & idcirco mentibus

PRÆFATIO.

bus nostris benè imprimenda, necesse est, vt eadem frequenti lectione sibi quisq; faciat familiaria: molestum verò est integrum Euclidis volumē perpetuò hinc & inde circumferre: arbitraber igitur, si in libellum redigetur minorem: commodius esse omnibus geometriæ studiosis, hæc percipere elementa: in primis verò ijs, qui iam aliquousq; in mathematicis disciplinis progressi sunt. Atq; hoc meum factū neminem sano iudicio præditum improbatum spero, cum non alio fiat animo, quàm vt quacuncq; ratione fieri possit, adolescentes ad fontes Geometriæ deducantur, ex quibus si salubriorem hauserint cognitionem, sibi rerum mathematicarum veriore, imò solidiorem comparent intellectū: nec desistam pro tenuitate mei ingenij studiosis perspicua reddere ea, quæ videntur obscuriora: atq; idcirco ὀνομαστικὸν γεωμετρικόν, quod superioribus mensi-

PRÆFATIO.

mensib. promisi, Deo Opt. Max. auxiliante, breui ad finem perducam, vt habeant harum disciplinarum studiosi in quo se exerceant. scio quantopere vocabula illa scientiarum propria impediunt lectorem, si non intelligantur: quæ certè si nunc fient planiora, facili-
mè ad puerorum græcorum gymnasia illa perueniemus, omniaq; ista nobis familiaria reddemus. Hæc sunt quæ hoc tempore in lucem exire volui, quum tamen nihil minus haberem in animo, & cogitassem primum Euclidis librum tantum pro meis discipulis, scholâq; nostra in publicum edere: sed amor ille, quo harum disciplinarum studiosos persequor, tantum potuit apud me, vt hæc adiunxerim, & reliqua quæ promisi, Deo iuuante, additurus sim: præsertim cum intelligam, hac mea qualiacumq; studia non paucis viris bonis & literatis placere: & quia I. T. C. tam benignè, & tanta cum humanitate ac be-

PRÆFATIO.

ac beneficentia priora mea scripta excepit, illisq; patrocinari dignata est, nō potui non hæc eadem sub I. T. C. tutelam tradere. id profecto verè dicere possum, in I. T. C. multa apparere singularia naturæ dona, quæ I. T. C. bene collocat, & ita ijs vititur, vt in hac I. T. C. ætate iam appareant prudentiæ, & pietatis non parvæ scintillæ, & nisi vererer, ne adulandi gratia me hæc scribere quispiam diceret: prolixius ea persequerer; sed res ipsa prædicat, I. T. C. indolem ingenij singularem: humanitatem Principe dignam: studium bonarum artium & linguarum tale vt I. T. C. cæteris sit exemplo, quo discipulos nostræ scholæ ad maiorem excitat diligentiam, quia I. T. C. vident nullum tempus prætermittere, quod non studijs bonarum artium & disciplinarum optimè impendat. Quare cū eiusmodi sint hæc, de quib. dixi dona, imò maiora, quã ut hoc loco celebrari pos-

PRÆFATIO.

possint aut debeant, meritò I. T. C. in patrocini-um studiorum est roganda, quia si vnquam bonæ literæ indiguerunt ope, & auxilio, hoc sanè tempore, quo rabies illa ignorantia adeò infestat bonas artes, & disciplinas, vt nisi Meccœnates sint multi & potentes, de literis iam actum videatur. Rogo itaq; I. T. C. ne in malam accipiat partem, quòd denuò compellem I. T. C. & Meccœnatem meorum studiorum esse velim, His me, meaq; studia I. T. C. commendo, id enim non alio, quàm ingenuo & bono facio animo, & quòd I. T. C. dignetur me meaq; studia in suum recipere patrocini-um, etiam atq; etiam exopto.

I. T. C. deditis:

Cunradus Dasy-
podius.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙ- ΣΕΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

ΟΡΟΙ.

Ισοι κύκλοι εἰσιν, ὧν αἱ διαμέτροι εἰσὶν ἴσαι· ἢ ὧν αἱ ἐκ τῶν κέντρων ἴσαι εἰσιν.

Ευθεῖα κύκλῳ ἐφάπτεσθαι λέγεται, ἢ πρὸς ἀπτόμενην τῷ κύκλῳ, καὶ ἐκβαλλομένη ἐτέμνη τὸν κύκλον.

Κύκλοι ἐφάπτεσθαι ἀλλήλων λέγονται, οἱ πινες ἀπτόμενοι ἀλλήλων, ἐτέμνεσθαι ἀλλήλους.

Ἐν κύκλῳ ἴσον ἀπέχον τῷ κέντρῳ εὐθείαι λέγονται: ὅταν αἱ ἀπὸ τῷ κέντρῳ ἐπ' αὐτὰς κάθῃται ἀγόμεναι ἴσαι ὦσι. μείζον δ' ἀπέχειν λέγεται ἐφ' ἧν ἢ μείζων κάθετος πίπτει.

Τμήμα κύκλῳ ἐστὶ τὸ περιεχόμενον γωνίᾳ, ὑπὸ τῇ εὐθείᾳ καὶ κύκλῳ περιφερείας.

Τμήμα \odot δὲ γωνία ἐστὶν, ἢ περιεχομένη ὑπὸ τῇ εὐθείᾳ, καὶ κύκλῳ περιφερείας.

Ἐν τμήματι δὲ γωνία ἐστὶν, ὅταν ἴπτι τῆς περιφερείας τῷ τμήματι \odot , ληφθῆ τι σημεῖον, καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἴπτι τὰ πέρατα τῆς εὐθείας

EVCLIDIS ELEMEN-
TORVM GEOMETRIÆ
LIBER TERTIVS.

Definitiones.

Circuli illi æquales sunt, quorum dia-
metri erunt æquales: vel qui æquales
habent ex centrīs ductas lineas rectas.

Illā rectā lineā dicetur circulum tange-
re, quæ cum tangit circulum, et producta fue-
rit, tamen non secat circulum.

Circuli dicuntur sese mutuo tangere, qui
dum sese tangunt, nō tamen sese mutuo secāt.

Rectæ in circulo æqualiter à centro di-
stare dicuntur: quando perpendiculares à
centro ad illas ductæ, æquales fuerint, longi-
us verò illa distare dicitur, in quam maior
cadit perpendicularis.

Segmentum circuli, est figura quæ lineā
rectā & circuli circumferentia continetur.

Angulus verò segmenti est, qui lineā re-
ctā, & circuli circumferentia continetur.

Angulus verò in segmento est, quando in
circumferentia segmenti sumptum fuerit ali-
quod punctum, & rectæ quædam ab eo pun-

ὀθείας ἥτις ἐστὶ βᾶσις τῆς τμήμας Θ ἐπε-
 ζευχθῶσιν ὀθείαι· ἢ περιεχομένη γωνία ὑ-
 πὸ τῶν ἐπιζευχθῶσιν ὀθείων. ὅταν δὲ αἱ
 περιέχουσαι τὴν γωνίαν ὀθείαι, ἀπολαμ-
 βάνουσι τίνα περιφέρουσαν ἐπὶ ἐκείνης λέγου-
 νται βεβηκέναι ἢ γωνία.

Τομῶς δὲ κύκλος ἐστὶν, ὅταν πρὸς τῷ κέν-
 τρῳ αὐτοῦ τῆς κύκλου σταθῇ ἢ γωνία, τὸ περιε-
 χόμενον σχῆμα ὑπὸ τῶν τὴν γωνίαν πε-
 ριεχοσῶν ὀθείων, καὶ τῆς ἀπολαμβανομέ-
 νης ὑπὸ αὐτῶν περιφερείας.

Ὁμοια τμήματα κύκλου ἐστὶν, τὰ δεχόμε-
 να γωνίας ἴσας· ἢ ἐν οἷς αἱ γωνίαι ἴσαι ἀλλή-
 λαις εἰσὶν.

Πρότασις α. Πρόβλημα.
 Τοῦ δοθέντος Θ κύκλου τὸ κέντρον εὐρεῖν.

Πρότασις β. Θεώρημα.
 Ἐὰν κύκλος ἐπὶ τῆς περιφερείας ληφ-
 θῇ δύο τυχόντα σημεῖα, ἢ ἐπὶ τὰ αὐτὰ ση-
 μεῖα ἐπιζευγνυμένη ὀθεία, ἐπιπέσει
 τῆς κύκλου.

Πρότασις γ. Θεώρημα.

Ἐὰν

LIBER III.

puncto ad extrema lineæ rectæ, quæ basis segmenti est, ductæ fuerint, angulus qui duabus illis ductis lineis rectis continetur, erit in segmento. Quando verò rectæ angulum continentés, absumpserint aliquam circumferentiæ partem, in illa dicetur angulus constitutus esse.

Sector circuli est, quando angulus fuerit ad centrum circuli constitutus, illa inquam figura, quæ continetur lineis rectis, angulum facientibus, & circumferentiæ parte, quæ lineis rectis istis est intercepta.

Similia segmenta circuli sunt, quæ æquales habent angulos, aut in quibus anguli sunt æquales.

D Propositio 1. Problema.
Ati circuli centrum inuestigare.

Propositio 2. Theorema.

Si in circuli circumferentiâ sumantur duo puncta, recta quæ duo puncta ista coniungit, intra circulum cadit.

Propositio 3. Theorema.

A 2

Si

Εὰν ἐν κύκλῳ ὁρθὰ τις διὰ τῆς κέντρως, ὀρθῆαι πινὰ μὴ διὰ τοῦ κέντρως δίχα τέμνη, καὶ πρὸς ὀρθὰς αὐτῷ τεμεῖ: καὶ εἰ πρὸς ὀρθὰς αὐτῷ τέμνη, ἔσονται δίχα αὐτῷ τεμεῖ.

Πρότασις δ. Θεώρημα.

Εὰν ἐν κύκλῳ δύο ὀρθῆαι τέμνωσιν ἀλλήλας, μὴ διὰ τῆς κέντρως ἴσων, ἔσονται ἀλλήλας δίχα.

Πρότασις ε. Θεώρημα.

Εὰν δύο κύκλοι τέμνωσιν ἀλλήλας, ὅσων ἴσων αὐτῶν τὸ αὐτὸ κέντρον.

Πρότασις ς. Θεώρημα.

Εὰν δύο κύκλοι ἐφάπτονται ἀλλήλων ἐπιπέδως: ὅσων ἴσων αὐτῶν τὸ αὐτὸ κέντρον.

Πρότασις ζ. Θεώρημα.

Εὰν κύκλος ὅστις τῆς διαμέτρου ληφθῆται σημεῖον, ὃ μὴ ἐστὶ κέντρον τῆς κύκλου, διὰ δὲ τῶν σημείων παραπίπτωσιν ὀρθῆαι πινὲς πρὸς τὸν κύκλον, μεγίστη μὲν ἴσων ἐφ' ἧς τὸ κέντρον, ἐλαχίστη δὲ ἡ λοιπῆ: τῶν δὲ ἄλλων αἰεὶ ἡ ἕξτων τῆς διὰ τοῦ κέντρως, τῆς ἀνώτερον μείζων ἐστὶ: δύο δὲ μόνον ὀρθῆαι ἴσων διὰ τῆς αὐτῆς

LIBER III.

3

Si in circulo recta quaedam per centrum ducta, aliam quandam rectam per centrum non ductam in duas secuerit partes, ad angulos rectos illam secabit: & si ad angulos rectos secat: etiam in duas partes aequales secabit.

Propositio 4. Theorema.

Si in circulo duae rectae sese mutuò secuerint, quae tamen per centrum non sunt ductae: non secant sese mutuò in duas partes aequales.

Propositio 5. Theorema.

Si duo circuli sese mutuò secant, non habent unum idemq; centrum.

Propositio 6. Theorema.

Si duo circuli sese mutuò internè secant: non habent unum, idemq; centrum.

Propositio 7. Theorema.

Si in diametro circuli sumatur aliquod punctum, quod non est centrum circuli, & à puncto isto ad circulū ductae sint quaedam lineae rectae, longissima erit illa, in qua est circuli centrum: reliqua verò omnium breuissima: ex alijs verò semper ea quae rectae per centrum ductae proximior est, longior erit ea, quae longius ab ea distat. duae verò solummodo sunt rectae a-

A 3 quales

αὐτὸ σημεῖον προαιρεσῶν) πρὸς τὸν κύκλον,
ἐφ' ἑκάτερα τῆς ἐλαχίστης.

Πρότασις η. Θεώρημα.

Εὰν κύκλος ληφθῆ πῖ σημεῖον ἐκτός ἀπὸ
δὲ τῶ σημεῖα πρὸς τὸν κύκλον διαχθῶσιν
ὄρθαιαι πίνες, ὧν μία μὲν διὰ τῶ κέντρους, αἱ δὲ
λοιπαὶ ὡς ἔτυχε, τῶν μὲν πρὸς τῶ κοίλῳ
περιφέρῳ προαιπίσῳν ὄρθῳν, μεγί-
στη μὲν ἢ διὰ τῶ κέντρους, τῶ δὲ ἄλλων, αἰεὶ ἢ ἔγ-
γιον τῆς διὰ τῶ κέντρους, τῆς ἀπώτερον μεί-
ζων ἔσται. τῶν δὲ πρὸς τῶ κυρτῶ περιφε-
ρείῳν προαιπίσῳν ὄρθῳν, ἐλαχίστη μὲν ἔ-
σιν ἢ μετὰ τῶ τούτε σημεῖα, ἢ τῆς διαμέτρους:
τῶν δὲ ἄλλων αἰεὶ ἢ ἔγγιον τῆς ἐλαχίστης τῆς
ἀπώτερον ἔσιν ἑλαπίων. δύο δὲ μόνον ὄρθαιαι
ἴσαι προαιπῶνται ἀπὸ τῶ σημεῖα πρὸς τὸν
κύκλον ἐφ' ἑκάτερα τῆς ἐλαχίστης.

Πρότασις θ. Θεώρημα.

Εὰν κύκλος ληφθῆ πῖ σημεῖον ἐντός, ἀπὸ
δὲ τῶ σημεῖα πρὸς τὸν κύκλον προαιπίσωσιν
πλείους ἢ δύο ὄρθαιαι ἴσαι, τὸ ληφθὲν σημεῖ-
ον κέντρον ἔσται τῶ κύκλου.

Πρό-

quales ductæ ab eodem isto puncto ad circum-
lulum ex utraq; parte lineæ brevissima.

Propositio 8. Theorema.

Si extra circumulum aliquod sumatur pun-
ctum, & ab eo puncto ad circumulum ducantur
quædam lineæ rectæ, quarum vna per cen-
trum sit ducta, reliquæ verò quovis modo, ex
quibus quæ ad concavam circumferentiam
cadunt, illa quæ per centrum est ducta, lon-
gissima erit, aliarum verò vnaquæq; quæ re-
ctæ per centrum ductæ proximior est, longi-
or erit remotiore. illarū verò quæ ad conue-
xam circumferentiam cadunt, brevissima est
quæ cadit inter punctum istud, & diametrū,
reliquarum verò semper ea, quæ proximior
erit brevissima, brevior erit remotiore. duæ
verò solummodo rectæ ab isto puncto, ad cir-
culum ex utraq; parte brevissima lineæ ca-
dent.

Propositio 9. Theorema.

Si punctum aliquod intra circumulum sumatur, &
ab eo puncto ad circumulum ducantur plures quàm duæ
rectæ æquales, punctum istud assumptum, centrum
est circuli.

A 4

Circus

Πρότασις ι. Θεώρημα.

Κύκλος \odot ἔ τέμνει κύκλον κτ' ὑπερέκκειον ση-
μεῖα ἢ δύο.

Πρότασις ια. Θεώρημα.

Εὰν δύο κύκλοι ἐφάπωνται ἀλλήλων ἐν-
τός, καὶ ληφθῇ αὐτῶν τὰ κέντρα: ἢ ἴπὶ τὰ
κέντρα αὐτῶν ἴπιζωγυμένη ὀρθία, ἔ ἐκ-
βαλλομένη, ἴπὶ τῶν σωμαφῶν πεσεῖται τῶν
κύκλων.

Πρότασις ιβ. Θεώρημα.

Εὰν δύο κύκλοι ἀπὼνται ἀλλήλων ἐκτός,
ἢ ἴπὶ τὰ κέντρα αὐτῶν ἴπιζωγυμένη. Διὰ
τῆς ἐπαφῆς ἐλῶσεται.

Πρότασις ιγ. Θεώρημα.

Κύκλος κύκλον σὺκ ἐφάπεται καὶ ὑπερέ-
κειον σημεῖα ἢ καθ' ἓν, ἑαυτὲ ἐντός, ἑαυτὲ ἐκτός ἐ-
φάπεται.

Πρότασις ιδ. Θεώρημα.

Ἐν κύκλῳ αἰ ἴσαι ὀρθίαι, ἴσον ἀπέχουσι
ἀπὸ τῶν κέντρων, καὶ αἰ ἴσον ἀπέχουσι ἀπὸ τῶν
κέντρων, ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν.

Πρότασις ιε. Θεώρημα.

Ἐν κύκλῳ μεγίστη μὲν ἐστὶν ἡ διάμετρος, τ'
ἢ ἄλ-

Propositio 10. Theorema.

Circulus circulum non secat in pluribus punctis, quàm in duobus tantum.

Propositio 11. Theorema.

Si duo circuli sese mutuò tangent intus, & eorum sumantur centra: recta quæ per centra illarum ducta fuerit, & extensa etiam cadet in contactum circularum.

Propositio 12. Theorema.

Si duo circuli sese mutuò tangent extra, recta quæ illorum centra coniungit, per contactum transit.

Propositio 13. Theorema.

Circulus circulum non tangit pluribus in punctis, quàm in vno tantum: siue intus id fiat, siue extra tangat.

Propositio 14. Theorema.

In circulo rectæ æquales, æqualiter à centro distant: & rectæ quæ æqualiter à centro distant, æquales inter se sunt.

Propositio 15. Theorema.

In circulo longissima est illa, quæ diame-

ἢ ἄλλων αἰεὶ ἢ ἕξιον τῶ κέντρῳ τῆς ἀπώπερον μείζων ἐστίν.

Πρότασις ις. Θεώρημα.

Ἡ τῆ Διὰ μέτρῳ τοῦ κύκλου πρὸς ὀρθὰς ἀπὸ ἀκρας ἀγομένη, ἔκτος πεσεῖται τῶ κύκλου, καὶ εἰς τὸν μέλαξυ τόπον τῆς τε ὀθείας καὶ τῆς περιφερείας ἑτέρα ὀθεῖα ἔ παρεμπεσεῖται, καὶ ἡ μὲν τῶ ἡμικυκλίου γωνία, ἀπώσης ὀξείας γωνίας ὀθυγράμμου μείζων ἐστίν· ἡ δὲ λοιπὴ ἔλαττων.

Πρότασις ιζ. Πρόβλημα.

Ἀπὸ τῶ δοθέντος σημείου, ἔ δοθέντος κύκλου ἐφαπτομένῳ ὀθεῖαν γραμμῶ ἀγαγεῖν.

Πρότασις ιη. Θεώρημα.

Ἐὰν κύκλος ἐφαπῆται πρὸς ὀθεῖα, ἀπὸ δὲ τῶ κέντρῳ ὀπὶ τῶ ἀφῶ ὀπιζῶχθῆ πρὸς ὀθεῖα· ἡ ὀπιζῶχθεῖσα, κάθετος ἐστὶ ὀπὶ τῶ ἀπτομένῳ.

Πρότασις ιθ. Θεώρημα.

Ἐὰν κύκλος ἐφαπῆται πρὸς ὀθεῖα, ἀπὸ δὲ τῆς ἀφῆς τῆ ἐφαπτομένη πρὸς ὀρθὰς γωνίας ὀθεῖα γραμμὴ ἀχθῆ, ὀπὶ τῆς ἀχθείσης ἐστὶ τὸ κέντρον τῶ κύκλου.

ter est, reliquarum verò illa semper, quæ proximior est centro, longior erit remotiore.

Propositio 16. Theorema.

Recta quæ ab alterutro extremo diametri ducta fuerit diametro ad angulos rectos, extra circulum cadet: & alia linea recta non cadet inter ipsam, & circuli circumferentiã: angulus verò semicirculi maior est quovis angulo acuto rectilineo, reliquus verò quovis acuto angulo rectilineo minor.

Propositio 17. Problema.

A dato puncto ducere lineam rectam, quæ datum circulum tangat.

Propositio 18. Theorema.

Si circulum aliqua linea recta tangat, & à centro ad contactum ducta fuerit quedam linea recta: illa quæ ducta est linea, erit perpendicularis ad eam quæ circulum tangit.

Propositio 19. Theorema.

Si recta quedam circulum tangat: à contactu verò ducatur quedam linea recta, quæ ad angulos sit rectos lineæ quæ circulum tangit: centrum circuli est in ea linea, quæ à contactu ad angulos rectos ducta est.

Πρότασις κ. Θεώρημα.

Εν κύκλῳ ἢ πρὸς τῷ κέντρῳ γωνία, διπλασίων ἐστὶ τῆ πρὸς τῇ περιφερείᾳ, ὅταν τὴν αὐτὴν περιφερείαν βάσιν ἔχωσιν αἱ γωνίαι.

Πρότασις κα. Θεώρημα.

Εν κύκλῳ αἱ ἐν τῷ αὐτῷ τμήματι γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν.

Πρότασις κβ. Θεώρημα.

Τῶν ἐν τοῖς κύκλοις τετραπλευρῶν, αἱ ἐπὶ ἐναντίον γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν.

Πρότασις κγ. Θεώρημα.

Ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας δύο τμήματα κύκλων ὅμοια καὶ ἄνισα, ἐσταθήσονται ὅτι τὰ αὐτὰ μέρη.

Πρότασις κδ. Θεώρημα.

Τὰ ἐπὶ ἴσων εὐθειῶν ὅμοια τμήματα κύκλων ἴσα ἀλλήλοις εἰσίν.

Πρότασις κε. Πρόβλημα.

Κύκλος τμήματι \odot δοθέντι \odot , προσανάγραψαι τὸν κύκλον ἕως ἐς τμήματι.

Πρότασις.

Propositio 20. Theorema.

In circulo angulus ad centrum constitutus duplus est ad angulum qui ad circumferentiã constituitur, tum scilicet, quando anguli eandẽ circumferentiã pro basi habuerit.

Propositio 21. Theorema.

In circulo anguli qui in eodem sunt segmento, sunt inter se æquales.

Propositio 22. Theorema.

Quadrilaterarum figurarum in circulo descriptarum anguli oppositi duobus rectis sunt æquales.

Propositio 23. Theorema.

Super eandem lineam rectam duo circulorum segmenta similia, & inæqualia non statuentur in easdem partes.

Propositio 24. Theorema.

Similia circulorum segmenta, quæ supra æquales rectas constituuntur, æqualia sunt.

Propositio 25. Problema.

Dato segmento circuli adscribere, & delineare circulum, cuius quidem sit datum segmentum.

Propo-

Πρότασις κς. Θεώρημα.

Εν τοῖς ἴσοις κύκλοις, αἱ ἴσῃ γωνία ἐπ' ἰσῶν περιφερῶν βεβήκασι, ἐάντε πρὸς τῆς κέντροις, ἐάντε πρὸς ταῖς περιφερείαις ὡς βεβηκῆαι.

Πρότασις κζ. Θεώρημα.

Εν τοῖς ἴσοις κύκλοις αἱ ἐπ' ἴσον περιφερῶν βεβηκῆαι γωνία, ἴσῃ ἀλλήλαις εἰσιν, ἐάντε πρὸς τοῖς κέντροις, ἐάντε πρὸς ταῖς περιφερείαις ὡς βεβηκῆαι.

Πρότασις κη. Θεώρημα.

Εν τοῖς ἴσοις κύκλοις αἱ ἴσῃ εὐθείαι ἴσας περιφερείας ἀφελῶσι, τὴν μὲν μείζονα τῆ μείζονι, τὴν δὲ ἐλάττωνα τῆ ἐλάττωι.

Πρότασις κθ. Θεώρημα.

Εν τοῖς ἴσοις κύκλοις ὑπὸ τὰς ἴσας περιφερείας, ἴσῃ εὐθείαι ὑπολείνθωσιν.

Πρότασις λ. Πρόβλημα.

Τὴν δοθεῖσαν περιφέρειαν δίχα τεμεῖν.

Πρότασις λα. Θεώρημα.

Εν κύκλῳ ἢ μὲν ἐν τῷ ἡμικυκλίῳ γωνία ὀρθὴ ἐστίν, ἢ δὲ ἐν τῷ μείζονι τμήματι ἐλάττων ὀρθῆς: ἢ δὲ ἐν τῷ ἐλάττωι, μείζων ὀρθῆς.

καὶ

Propositio 26. Theorema.

In circulis æqualibus, anguli æquales, æqualibus in circumferentijs constituuntur, siue ad centra, siue ad circumferentias constituantur.

Propositio 27. Theorema.

In circulis æqualibus, anguli qui consistunt in circumferentijs æqualibus, æquales inter se sunt: siue ad centra, siue ad circumferentias constituantur.

Propositio 28. Theorema.

In circulis æqualibus, rectæ æquales, etiã æquales auferent circumferentias, maiorem maiori æqualem, & minorem minori.

Propositio 29. Theorema.

In circulis æqualibus, rectæ æquales, subtendunt etiã circumferentias æquales.

Propositio 30. Problema.

Datã circumferentiã secare in duas partes æquales.

Propositio 31. Theorema.

In circulo angulus qui est in semicircolo est reclus, qui verò in maiore est segmento, minor erit reclus: qui verò in minore segmento consti-

καὶ ἔπι ἢ μὲν τῶ μείζοντι τμήματι γωνία μείζων ἐστὶν ὀρθῆς, ἢ δὲ τῶ ἐλάττωτος τμήματι γωνία, ἐλάττω ἐστὶν ὀρθῆς.

Πρότασις λβ. Θεώρημα.

Εὰν κύκλος ἐφάπτηται πρὸς εὐθείᾳ, ἀπὸ δὲ τῆς ἀφῆς ἐπι τὸν κύκλον διαχθῆ πρὸς εὐθείᾳ τέμνονσα τὸν κύκλον, ἅς ποιῆι γωνίας πρὸς τῇ ἐφαπτομένῃ ἴσας ἔσονται ταῖς ἐν τοῖς ἐναλλάξι τῶ κύκλου τμήμασι γωνίας.

Πρότασις λγ. πρόβλημα.

Επι τῆς δοθείσης εὐθείας γραψαί τμήμα κύκλου δεχόμενον γωνίαν ἴσλη, τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ ἐνυγραμμῶ.

Πρότασις λδ. πρόβλημα.

Απὸ τῶ δοθέντος κύκλου τμήμα ἀφελῆν δεχόμενον γωνίαν ἴσλη τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ ἐνυγραμμῶ.

Πρότασις λε. Θεώρημα.

Εὰν ἐν κύκλῳ δύο εὐθεῖαι τέμνωσιν ἀλλήλας, τὸ ὑπὸ τῶν τῆς μίας τμημάτων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν τῆς ἐτέρας τμημάτων περιεχομένῳ ὀρθογώνιῳ.

Πρότα-

constituetur maior recto. præterea angulus segmenti maioris, maior recto, minoris verò segmenti, minor recto erit.

Propositio 32. Theorema.

Si recta quædam circulum tangat, à contactu verò ad circulum ducatur quædam recta circulum secans: quoscunq; fecerit angulos ad lineam contingentē: æquales erunt angulis q̄ in segmentis sunt p̄mutatim sumptis.

Propositio 33. Problema.

Super datam lineam rectam describere segmentum circuli, quod contineat angulum dato angulo rectilineo æqualem.

Propositio 34. Problema.

A dato circulo auferre segmentum, quod contineat angulum æqualem, dato angulo rectilineo.

Propositio 35. Theorema.

Si in circulo duæ rectæ sese secant: re-ctangulum quod continetur segmentis vnius, æquale est re-ctangulo, quod continetur segmentis alterius.

B Propo-

Πρότασις λς. Θεώρημα.

Εὰν κύκλος ληφθῆτε σημεῖον ἐκτός, καὶ ἀπ' αὐτοῦ πρὸς τὸν κύκλον παραίπλωσι δύο ὀρθαῖαι, καὶ ἡ μὲν αὐτῶν τέμνη τὸν κύκλον, ἡ δὲ ἐφάπτηται: ἔσται τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης τεμνύσεως καὶ τῆς ἐκτός ἀπολαμβανομένης μεταξὺ τούτου σημείου καὶ τῆς κυρτῆς περιφερείας περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς ἐφαπτομένης τετραγώνῳ.

Πρότασις λς. Θεώρημα.

Εὰν κύκλος ληφθῆτε σημεῖον ἐκτός, ἀπὸ δὲ τῶν σημείων πρὸς τὸν κύκλον παραίπλωσι δύο ὀρθαῖαι, ἡ μὲν αὐτῶν τέμνη τὸν κύκλον, ἡ δὲ παραίπτη, ἡ δὲ τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης τεμνύσεως, καὶ τῆς ἐκτός ἀπολαμβανομένης μεταξὺ τούτου σημείου καὶ τῆς κυρτῆς περιφερείας, ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς παραίπλωσεως, ἢ παραίπλωσαι ἐφάπτηται τῷ κύκλῳ.

Τέλος τῶν β. στοιχείων.

ΕΥΚΛΕΙ-

Propositio 36. Theorema.

Si in circulo aliquod sumatur punctum extrinsecus: & ab eo ad circulum cadant duæ lineæ rectæ, quarum altera circulum secet, altera circulum tangat: rectangulum quod continetur à tota recta secante, & recta quæ extrinsecus intra punctum & conuexam circumferentiam intercipitur, æquale est quadrato lineæ rectæ tangentis.

Propositio 37. Theorema.

Si in circulo punctum aliquod extrinsecus sumatur, & à puncto ad circulum cadant lineæ duæ rectæ, quarum altera circulum secet, altera verò incidat in circulum: sit verò rectangulum, quod à tota secante, & ea quæ intra punctum & conuexam circumferentiã ponitur æquale quadrato lineæ rectæ incidentis: recta ista quæ incidit, tanget circulum.

Finis libri tertij elementorum.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

ΟΡΟΙ.

Σχῆμα ὀρθόγραμμον εἰς γῆμα ὀρθόγραμμον ἐγγραφέαται λέγεται, ὅταν ἐκάστη τῶν τῶν ἐγγραφομένων γῆμα $\text{\textcircled{C}}$ γωνιῶν ἐκάστης πλωρᾶς τῶν εἰς ὃ ἐγγραφέται ἀπίηται.

Σχῆμα δὲ ὁμοίως πρὸς γῆμα πειγγραφέαται λέγεται. ὅταν ἐκάστη πλωρὰ ἔῃ πειγγραφομένη, ἐκάστης γωνίας τῶν πρὸς ὃ πειγγραφέται ἀπίηται.

Σχῆμα δὲ ὀρθόγραμμον εἰς κύκλον ἐγγραφέαται λέγεται, ὅταν ἐκάστη γωνία τῶν ἐγγραφομένων ἀπίηται τῆς τῶν κύκλου περιφερείας.

Σχῆμα δὲ εὐθύγραμμον πρὸς κύκλον πειγγραφέαται λέγεται, ὅταν ἐκάστη πλωρὰ τῆς τῶν κύκλου περιφερείας τοῦ πειγγραφομένου ἐφάπτηται.

Κύκλος δὲ ὁμοίως εἰς γῆμα λέγεται ἐγγραφέαται ὅταν ἢ τῶν κύκλου περιφέρεια ἐκάστης πλωρᾶς τῶν εἰς ὃ ἐγγραφέται ἀπίηται.

Κύκλος $\text{\textcircled{C}}$

EVCLIDIS ELEMENTO-
RVM LIBER QVARTVS.

Definitiones.

Figura rectilinea dicitur in figuram rectilineam inscribi, quando vnusquisq; angulus eius figuræ, quæ inscribitur, tangit vnumquodq; lat^o figuræ, in quam est inscripta.

Figura etiã dicitur similitudine quadam circa figuram describi: quando vnumquodq; latus figuræ circũscriptæ tangit vnumquemque angulum eius figuræ, circa quam describitur.

Figura rectilinea in circulum inscribi dicitur: quando vnusquisq; angulus figuræ inscriptæ tangit circuli circumferentiam.

Figura rectilinea dicitur circa circulum describi, quando vnusquisq; angulus tangit circuli circa quem describitur figura, circumferentiam.

Circulus verò similiter dicitur in figuram inscribi, quando circuli circumferentia tangit vnumquodq; latus figuræ eius, in quã inscribitur.

Κύκλος δὲ πρὸς ἄκρον περιγράφεται λέγεται, ὅταν ἡ τῷ κύκλῳ περιφέρουσα ἐκάστης γωνίας τῷ πρὸς ὃ περιγράφεται ἀπληταί.

Ευθεῖα εἰς κύκλον ἐναρμόζεται λέγεται ὅταν τὰ πέρατα αὐτῆς ὄπῃ τῆς περιφερείας ἢ τῷ κύκλῳ.

Πρότασις α. Πρόβλημα.

Εἰς τὸν δοθέντα κύκλον τῇ δοθείσῃ ευθείᾳ μὴ μείζονι ἔσῃ τῆς ἑκείνου κύκλου διαμέτρου: ἴστω ευθεῖαν ἐναρμόσαι.

Πρότασις β. πρόβλημα.

Εἰς τὸν δοθέντα κύκλον, τῷ δοθέντι τριγώνῳ, ἴσογώνιον τρίγωνον ἐγράψαι.

Πρότασις γ. πρόβλημα.

Περὶ τὸν δοθέντα κύκλον, τῷ δοθέντι τριγώνῳ, ἴσογώνιον τρίγωνον περιγράψαι.

Πρότασις δ. πρόβλημα.

Εἰς τὸ δοθὲν τρίγωνον κύκλον ἐγράψαι.

Πρότασις ε. πρόβλημα.

Περὶ τὸ δοθὲν τρίγωνον κύκλον περιγράψαι.

Πρό-

Circulus verò dicitur circa figuram describi, quando circuli circumferentia tangit unumquemq; angulum figurae, circa quam circulus describitur.

Recta linea dicitur in circulum coaptari, quando eius extrema fuerint in circumferentia circuli.

Propositio 1. problema.

I*N datum circulum, datae lineae rectae, quae non maior est diametro circuli aequalem rectam applicare.*

Propositio 2. problema.

In datum circulum dato triangulo, triangulum aequales habentem cum dato triangulo angulos, inscribere.

Propositio 3. problema.

Circa datum circulum dato triangulo circumscribere triangulum, qui aequales habeat angulos cum dato triangulo.

Propositio 4. problema.

In datum triangulum inscribere circulum.

Propositio 5. problema.

Circa datum triangulum circulum circumscribere.

Πρότασις ε. πρόβλημα.

Εἰς τὸν δοθέντα κύκλον, τετράγωνον ἐγ-
γραψάσαι.

Πρότασις ζ. πρόβλημα.

Περὶ τὸν δοθέντα κύκλον, τετράγωνον πε-
ριεγγραψάσαι.

Πρότασις η̄. πρόβλημα.

Εἰς τὸ δοθὲν τετράγωνον κύκλον ἐγγραψάσαι.

Πρότασις θ. πρόβλημα.

Περὶ τὸ δοθὲν τετράγωνον, κύκλον περι-
εγγραψάσαι.

Πρότασις ι. πρόβλημα.

Ἰσοσκελὲς τρίγωνον συστήσασθαι, ἔχον ἐκά-
περαν τῶν πρὸς τῇ βάσει γωνιῶν διπλασίω-
να τῆς λοιπῆς.

Πρότασις ιᾱ. πρόβλημα.

Εἰς τὸν δοθέντα κύκλον, πεντάγωνον
ἰσοπλευρὸν τε καὶ ἰσογώνιον ἐγγραψάσαι.

Πρότασις ιβ. πρόβλημα.

Περὶ τὸν δοθέντα κύκλον, πεντάγωνον ἰ-
σοπλευρὸν τε καὶ ἰσογώνιον περιεγγραψάσαι.

Πρότασις ιγ. πρόβλημα.

Εἰς τὸ δοθὲν πεντάγωνον, ὁ ἐστὶν ἰσοπλευ-
ρὸν τε καὶ ἰσογώνιον, κύκλον ἐγγραψάσαι.

Propositio 6. problema.

Circulo dato inscribere quadratum.

Propositio 7. problema.

Circulo dato circumscribere quadratum.

Propositio 8. problema.

Dato quadrato inscribere circulum.

Propositio 9. problema.

Dato quadrato circulum circumscribere.

Propositio 10. problema.

Triangulum duo equalia habentem latera constituere, qui habeat alterutrum angulorum ad basin duplum reliqui anguli.

Propositio 11. problema.

Dato circulo inscribere pentagonon, quod & latera equalia, & angulos aequales habeat.

Propositio 12. problema.

Dato circulo pentagonon circumscribere, quod & latera equalia, & angulos aequales habeat.

Propositio 13. problema.

Dato pentagono quod latera equalia, & angulos aequales habet, circulum inscribere.

Πρότασις ιδ. πρόβλημα.

Περὶ τῷ δοθέν πεντάγωνον, ὃ ἐστὶν ἰσόπλευρον τε καὶ ἰσογώνιον κύκλον περιγράψαι.

Πρότασις ιε. πρόβλημα.

Εἰς τὸν δοθέντα κύκλον ἐξάγωνον ἰσόπλευρον τε καὶ ἰσογώνιον ἐγράψαι.

Πρότασις ις. πρόβλημα.

Εἰς τὸν δοθέντα κύκλον πενήτηκαδεκάγωνον ἰσόπλευρον τε καὶ ἰσογώνιον ἐγράψαι.

Τέλος τοῦ δι' Εὐκλείδου
βιβλίου.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ
ΠΕΜΠΤΟΝ.

ΟΡΟΙ

Μερὲς ἐστὶ μέγεθος μεγέθους τὸ ἐλάσσον τῷ μείζονι, ὅταν καταμετρηῖ τὸ μείζον.

Πολλαπλάσιον δὲ τὸ μείζον τῷ ἐλάσσονι, ὅταν κῆμετρηῖται ὑπὸ τῷ ἐλάττιον.
λόγος

Propositio 14. problema.

*Dato pentagono, quod & equalia latera,
& angulos aequales habet, circumscribere cir-
culum.*

Propositio 15. problema.

*Dato circulo hexagonon quod equalia ha-
bet latera, & angulos aequales inscribere.*

Propositio 16. problema.

*Dato circulo figuram rectilineam quinde-
cim angulorum, quæ equalia latera, & angu-
los aequales habent, inscribere.*

Finis libri quarti Elementorum
Euclidis.

EVCLIDIS ELEMEN-
TVM QVINTVM.

Definitiones.

Magnitudo alterius magnitudinis mi-
nor maioris est pars, quando minor
exactè metitur maiorem.

Magnitudo alterius magnitudinis mul-
tiplex est maior minoris, cum sub minoris ca-
dit mensuram.

Ra-

Λόγος ἐστὶ δύο μεγεθῶν ὁμογενῶν ἢ κατὰ
πηλικότητά πρὸς ἀλλήλα ποιά σχέσις.

Λόγον ἔχον πρὸς ἀλλήλα μεγέθη λέγεται,
ἂ διώαται πολλαπλασιαζόμενα, ἀλλήλων
ὑπερέχον.

Ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ μεγέθη λέγεται εἶναι,
πρῶτον πρὸς δεύτερον, καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον,
ὅταν τὰ εἰς πρῶτον καὶ τρίτον ἰσάκεις πολλαπλα-
σια, τὸ δὲ δεύτερον καὶ τέταρτον ἰσάκεις πολλα-
πλασιῶν καθ' ὁποιοῦν πολλαπλασιασμὸν
ἐκάτερον ἐκάτερον, ἢ ἅμα ἐλλείπη, ἢ ἅμα ἴσῃ ἢ
ἢ ἅμα ὑπερέχη ληφθέντα κατ' ἀλλήλα.

Τὰ δὲ τὸν αὐτὸν ἔχοντα μεγέθη λόγον, ἀ-
νάλογον καλεῖσθαι.

Ὅταν δὲ τῶν ἰσάκεις πολλαπλασιῶν, τὸ
μὲν τὸ πρῶτον πολλαπλασίον, μὴ ὑπερέ-
χη τοῦ δὲ δεύτερου πολλαπλασίον, τὸ δὲ τοῦ
τρίτου πολλαπλασίον, μὴ ὑπερέχη τὸ πῆ-
τάρτον πολλαπλασίον, τότε τὸ πρῶτον πρὸς
τὸ δεύτερον, μείζονα λόγον ἔχον λέγεται εἶπερ
τὸ τρίτον πρὸς τὸ τέταρτον.

Αναλογία δὲ ἐστὶν ἢ τῶν λόγων ὁμοιότης.

Αναλογία δὲ ἐστὶν ἐν τρισὶν ὅροις ἐλαχίστις
ἐστίν. Ὅταν

Ratio est duarum magnitudinum homogenearum secundum quantitatem inter se quaedam habitudo.

Magnitudines inter se rationem habere dicuntur, quae multiplicatae possunt sese mutuo excedere.

Magnitudines dicuntur in eadem ratione esse prima ad secundam, & tertia ad quartam, quando primae & tertiae aequè multiplicatae, secundae & quartae aequè multiplicatae, iuxta quamvis multiplicationem utraque, utramque, vel una deficit, vel una assequitur, vel una superat sumptae inter se.

Eandem autem habentes rationem vocentur proportionales.

Quando autem aequaliter multiplicium, primae quidem multiplex exuperat secundae multiplicem, tertiae autem multiplex non exuperat quartae multiplicem: tunc prima ad secundam maiorem habere dicitur rationem, quam tertia ad quartam.

Proportio vero est similitudo rationum.

Proportio autem in tribus terminis minima est.

Quan-

Όταν δὲ τριὰ μεγέθη ἀνάλογον ἦ, τὸ πρῶτον πρὸς τὸ τρίτον διπλασίονα λόγον ἔχῃ λέγεται ἡὼς πρὸς τὸ δεύτερον.

Όταν δὲ τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον ἦ, τὸ πρῶτον πρὸς τὸ τέταρτον τριπλασίονα λόγον ἔχειν λέγεται: ἡὼς πρὸς τὸ δεύτερον, καὶ αἰεὶ ἐξῆς ἐνὶ πλείον, ἕως αὐτῆς ἀναλογίας ὑπάρχει.

Ομόλογα μεγέθη λέγεται εἶναι, τὰ μὲν ἡγέμενα τοῖς ἡγεμένοις, τὰ δὲ ἐπόμενα τοῖς ἐπομένοις.

Ἐναλλάξ λόγος ἐστὶ, λῆψις τῶν ἡγεμένων πρὸς τὸ ἡγέμενον, καὶ τῶν ἐπομένων πρὸς τὸ ἐπόμενον.

Ἀνάπαλιν λόγος ἐστὶ, λῆψις τῶν ἐπομένων, ὡς ἡγεμένων, πρὸς τὸ ἡγέμενον ὡς ἐπόμενον.

Συνήθεσι λόγος ἐστὶ, λῆψις τοῦ ἡγεμένου μετὰ τὸ ἐπόμενον ὡς ἐνὸς πρὸς αὐτὸ τὸ ἐπόμενον.

Διαίρεσις δὲ λόγος ἐστὶ, λῆψις τῆς ὑπεροχής, ἢ ὑπερέχει τὸ ἡγέμενον τῶν ἐπομένων πρὸς αὐτὸ τὸ ἐπόμενον.

Ἀνα-

Quando autem tres magnitudines proportionales fuerint prima ad tertiam, duplā rationem habere dicitur, quā ad secundam.

Quando autē quatuor magnitudines proportionales fuerint, prima ad quartam triplam rationem habere dicitur, quā ad secundam: & semper deinceps vna plus, quam diu proportio fuerit.

Homologae magnitudines esse dicuntur, antecedentes antecedentibus, & consequentes consequentibus.

Alternata ratio est assumptio antecedentis ad antecedentem, & consequentis ad consequentem.

Inuersa ratio est assumptio consequentis, vt antecedentis, ad antecedentem, tanquam consequentem.

Compositio rationis est assumptio antecedentis cum consequente tanquam vnius, ad ipsum consequens.

Diuisio rationis est assumptio exuperantiae, qua maior est antecedens consequente, ad ipsum consequens.

Reuer-

Ανάστροφὴ λόγος ἐστὶ λήψις τῶ ἡγχιμένου
πρὸς τὴν ὑπεροχλήν ἢ ὑπερέχον τὸ ἡγχι-
μῆμον τῶ ἐπομένον.

Δύοσιν λόγος ἐστὶ, πλειόνων ὄντων μεγα-
θῶν, καὶ ἄλλων αὐτοῖς ἴσων τὸ πλῆθος σὺν
δυο λαμβανομένων, καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ: ὅ-
ταν ἢ ὡς ἐν τοῖς πρώτοις μεγέθεσι τὸ πρῶτον
πρὸς τὸ ἕχαλον: οὕτως ἐν τοῖς δεύτεροις μεγέ-
θεσι τὸ πρῶτον πρὸς τὸ ἕχαλον, ἢ ἄλλως λή-
ψις τῶ ἄκρων καθ' ὑπεξάιρεσιν τῶν μέσων.

Τεταγμένη ἀναλογία ἐστὶν ὅταν ἢ ὡς ἡ-
γχιμῆμον πρὸς ἐπόμενον ἕτος ἡγχιμῆμον πρὸς
τὸ ἐπόμενον: ἢ δὲ καὶ ὡς ἐπόμενον πρὸς ἄλλό-
τι, ἕτως ἐπόμενον πρὸς ἄλλότι.

Τεταραγμένη δὲ ἀναλογία ἐστὶν, ὅταν τρι-
ῶν ὄντων μεγεθῶν, καὶ ἄλλων ἴσων αὐτοῖς τὸ
πλῆθος γίνεταί, ὡς μὲν ἐν τοῖς πρώτοις με-
γέθεσιν, ἡγχιμῆμον πρὸς ἐπόμενον: οὕτως ἐν
τοῖς δεύτεροις μεγέθεσιν ἡγχιμῆμον πρὸς ἐ-
πόμενον: ὡς δὲ ἐν τοῖς πρώτοις μεγέθεσιν
ἐπόμενον πρὸς ἄλλότι * οὕτως ἐν τοῖς δεύτε-
ροις μεγέθεσιν ἡγχιμῆμον πρὸς ἄλλότι.

* *Aliter*, ὅταν ἐν τοῖς δευτέροις μεγέθεσιν ἄλλότι πρὸς

ἡγχιμῆμον.

Πρώτα

Reuersio rationis est assumptio antecedentis ad exuperantiam, qua maior est antecedens consequente.

Ex æquo ratio est pluribus positis magnitudinibus, & alijs eas æquantibus multitudine, binis sumptis, & in eadem ratione, cum est, vt in primis magnitudinibus prima ad vltimam, sic in secundis magnitudinibus prima ad vltimam, aut aliter assumptio extremorum per subductionem mediorum.

Ordinata proportio est, quando est vt antecedens ad consequentem, sic antecedens ad consequentem, erit autem etiam vt consequens ad aliam quandam, sic consequens ad aliam quandam.

Perturbata proportio autem est, quando tribus positis magnitudinibus, & alijs æqualibus eis multitudine, fit vt in primis magnitudinibus antecedens ad consequentem, sic in secundis magnitudinibus antecedens ad consequentem. vt autem in primis magnitudinibus consequens ad aliam quandam, sic in secundis magnitudinibus alia quedam ad antecedentem.

Πρότασις α. Θεώρημα.

Εὰν ἡ ὀπόσοιῦ μεγέθη, ὀπόσων ἔν μεγε-
θῶν ἴσων τὸ πλῆθος, ἕκαστον ἕκαστα ἰσάκεις
πολλα πλάσιον: ὅσα πλάσιον ἔσιν ἐν τῶν με-
γεθῶν ἔν: τοσαῦτα πλάσια ἔσται καὶ τὰ πάν-
τα τῶν πάντων.

Πρότασις β. Θεώρημα.

Εὰν πρῶτον δῦτέρου ἰσάκεις ἢ πολλα-
πλάσιον, καὶ τρίτον τετάρτη, ἢ δὲ καὶ πέμ-
πτον δῦτέρη ἰσάκεις πολλαπλάσιον, καὶ ἕκ-
τον τετάρτη, καὶ σωτεθὲν πρῶτον ἔ πέμ-
πτον, δῦτέρη ἰσάκεις ἔσται πολλαπλάσιον,
καὶ τρίτον καὶ ἕκτον τετάρτη.

Πρότασις γ. Θεώρημα.

Εὰν πρῶτον δῦτέρου ἰσάκεις ἢ πολλα-
πλάσιον, καὶ τρίτον τετάρτη: ληφθῆ ἢ ἰσά-
κεις πολλαπλάσια τῶ πρῶτη καὶ τρίτη, καὶ
δίισα τῶν ληφθέντων, ἕκατερον ἕκατέρου
ἰσάκεις ἔσται πολλαπλάσιον, τὸ μὲν, τῶ δῦ-
τέρου, τὸ δὲ, τοῦ τετάρτη.

Πρότασις δ. Θεώρημα.

Εὰν πρῶτον πρὸς δῦτερον ἢ αὐτὸν ἔχη λό-
γον, καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον, καὶ τὰ ἰσάκεις
πολλα-

Propositio 1. Theorema.

Si sint quotlibet magnitudines, quotlibet magnitudinum equalium multitudine unaquæq; unius cuiusq; æque multiplex, quotuplex est una magnitudinum unius, totuplices erunt omnes omnium.

Propositio 2. Theorema.

Si fuerit magnitudo prima magnitudinis secundæ equaliter multiplex, & tertia quartæ: fuerit item quinta secundæ equaliter multiplex, & sexta quartæ: erit coniuncta magnitudo prima cum quinta, equaliter multiplex secundæ, & tertia cum sexta quartæ.

Propositio 3. Theorema.

Si fuerit magnitudo prima magnitudinis secundæ equaliter multiplex, & tertia quartæ: & si sumptæ fuerint equaliter multiplices magnitudines primæ & tertiæ: erit etiam eæ æquo altera alterius equaliter multiplex: illa quidem secundæ, hæc verò quartæ.

Propositio 4. Theorema.

Si magnitudo prima ad magnitudinem secundam eam habuerit proportionem, quam

C 2 tertia

πολλαπλάσια ἔτε πρῶτα ἔ τρίτα πρὸς
τὰ ἰσάκεις πολλαπλάσια τῶ δ' ἑτέρας καὶ τε-
τάρτα καὶ ὅποιον ἔν πολλαπλασιασμόν
τὸν αὐτὸν ἔξ' λόγον ληφθέντα κατὰλληλα

Πρότασις ε. Θεώρημα.

Εὰν μέγεθος Θ μεγέθους ἰσάκεις ἢ πολλα-
πλάσιον, ὅπως ἀφαιρεθὲν ἀφαιρεθῆν Θ : καὶ
τὸ λοιπὸν τῶ λοιποῦ ἰσάκεις ἔσται πολλαπλά-
σιον ὅσα πλάσιόν ἐστι τὸ ὅλον τῶ ὅλου.

Πρότασις ς. Θεώρημα.

Εὰν δύο μεγέθη δύο μεγεθῶν ἰσάκεις ἢ πολ-
λαπλάσια, καὶ ἀφαιρεθῆντα πινὰ τῶν αὐτῶν
ἰσάκεις ἢ πολλαπλάσια: ἔ τὰ λοιπὰ τοῖς αὐ-
τοῖς ἢ τοῖς ἴσας ἔσιν, ἢ ἰσάκεις αὐτῶν πολλα-
πλάσια.

Πρότασις ζ. Θεώρημα.

Τὰ ἴσα πρὸς τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον,
καὶ τὸ αὐτὸ πρὸς τὰ ἴσα.

Πρότασις η. Θεώρημα.

Τῶν ἀνίσων μεγεθῶν τὸ μείζον πρὸς τὸ
αὐτὸ μείζονα λόγον ἔχει, ἢ ὅπως τὸ ἔλαττον, καὶ
τὸ αὐτὸ πρὸς τὸ ἔλαττον, μείζονα λόγον ἔχει
ἢ ὅπως πρὸς τὸ μείζον.

Πρότα-

tertia ad quartam: etiam æqualiter multiplicæ magnitudines primæ & tertiæ, ad æqualiter multiplicæ magnitudines secundæ & quartæ, iuxta quamvis multiplicationem eandem habebūt proportionē, inter se collatæ.

Propositio 5. Theorema.

Si magnitudo magnitudinis æqualiter fuerit multiplex, vt ablata ablatæ: erit etiã reliqua reliquæ æqualiter multiplex, vt tota totius.

Propositio 6. Theorema.

Si duæ magnitudines duarum magnitudinum æqualiter fuerint multiplicæ: et ablatæ quædam earūdem fuerint æqualiter multiplicæ: erunt etiam reliquæ eisdem vel æquales, vel earundem æqualiter multiplicæ.

Propositio 7. Theorema.

Æquales magnitudines ad eandem, eandem habent proportionē, & eadē ad æquales.

Propositio 8. Theorema.

Magnitudinum inæqualium maior ad eandem maiorem habet proportionem quàm minor: & eadem illa magnitudo ad minorem habet proportionem maiorem, quàm ad maiorem.

Πρότασις θ. Θεώρημα.

Τὰ πρὸς τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν ἔχοντα λόγον, ἴσα ἀλλήλοις ἐσὶ, καὶ πρὸς ἄ τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν ἔχον λόγον, καὶ κείνα ἴσα ἀλλήλοις ἐσὶν.

Πρότασις ι. Θεώρημα.

Τῶν πρὸς τὸ αὐτὸ λογόν ἔχόντων, τὸ ἤ μείζονα λόγον ἔχον, ἐκείνο μείζον ἐστὶ, πρὸς ὃ δὲ τὸ αὐτὸ μείζονα λόγον ἔχει, ἐκείνο ἐλαττον ἐστὶν.

Πρότασις ια. Θεώρημα.

Οἱ τὰ αὐτὰ λόγῳ οἱ αὐτοὶ, καὶ ἀλλήλοις ἐσὶν οἱ αὐτοί.

Πρότασις ιβ. Θεώρημα.

Εὰν ἡ ὀποιοῦν μεγέθη ἀνάλογον, ἔσται ὡς ἐν τῶν ἡγεμένων πρὸς ἐν τῶν ἐπομένων, ἕτως ἅπαντα τὰ ἡγεύματα, πρὸς ἅπαντα τὰ ἐπόμματα.

Πρότασις ιγ. Θεώρημα.

Εὰν πρῶτον πρὸς δεύτερον τὸν αὐτὸν ἔχη λόγον, καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον, τρίτον δὲ πρὸς τέταρτον μείζονα λόγον ἔχη, ἢ ὡς πέμπτον πρὸς ἕκτον, καὶ πρῶτον πρὸς δεύτερον μείζονα λόγον ἔξει, ἢ ὡς πέμπτον πρὸς ἕκτον.

Πρό-

Propositio 9. Theorema.

Magnitudines ad eandem, eandem habentes proportionem, æquales sunt inter se, & ad quas eadem, eandem habet proportionem: etiam illæ sunt inter se æquales.

Propositio 10. Theorema.

Quæ ex magnitudinibus ad eandem, proportionem habentibus maiorem habet proportionem, illa est maior: & ad quam eadem maiorem habet proportionem, illa est minor.

Propositio 11. Theorema:

Quæ eidem proportioni sunt eadem: illæ etiam inter se sunt eadem.

Propositio 12. Theorema.

Si fuerint magnitudines quoclibet proportionales: erit quemadmodum vna præcedentium, ad vnâ consequentium: sic omnes præcedentes ad omnes consequentes.

Propositio 13. Theorema.

Si magnitudo prima ad secundam, eam habuerit proportionem, quam tertia ad quartam: tertia verò ad quartam maiorem habuerit proportionem, quàm quinta ad sextam: tum etiam prima ad secundam maiorem habebit proportionem, quàm quinta ad sextam.

Πρότασις ιδ. θεώρημα.

Εάν πρῶτον πρὸς δεύτερον τὸν αὐτὸν ἔχη λόγον, καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον, τὸ δὲ πρῶτον τῷ τρίτῳ μείζον ἢ, καὶ τὸ δεύτερον τῷ τετάρτῳ μείζον ἔσται. καὶ ἴσον, ἴσον, καὶ ἔλαστος, ἔλαστος.

Πρότασις ιε. θεώρημα.

Τὰ μέρη, τῆς ὡσαύτως πολλαπλασίοις, τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ληφθέντα κατ'ἀλληλα.

Πρότασις ις. θεώρημα.

Εὰν τέσσαρα μεγέθη, ἀνάλογον ἢ, καὶ ἐναλλάξ, ἀνάλογον ἔσται.

Πρότασις ιζ. θεώρημα.

Εὰν συγκείμενα μεγέθη, ἀνάλογον ἢ, καὶ διαιρεθέντα ἀνάλογον ἔσται.

Πρότασις ιη. θεώρημα.

Εὰν διηρημένα μεγέθη, ἀνάλογον ἢ, καὶ σωπεθέντα ἀνάλογον ἔσται.

Πρότασις ιθ. θεώρημα.

Εὰν ἢ, ὡς ὅλον, πρὸς ὅλον, ἔτως ἀφαιρεθῆν, πρὸς ἀφαιρεθῆν, καὶ τὸ λοιπὸν, πρὸς τὸ λοιπὸν ἔσται, ὡς ὅλον πρὸς ὅλον.

Εὰν

Propositio 14. Theorema.

Si magnitudo prima ad secundam eam habuerit proportionem, quam tertia ad quartam: & si prima maior fuerit quàm tertia, etiam secunda erit maior quàm quarta, & se æqualis æqualis, & si minor minor.

Propositio 15. Theorema.

Partes inter se collatæ, eã habent proportionem, quam suæ æqualiter multiplicēs.

Propositio 16. Theorema.

Si quatuor magnitudines fuerint proportionales, etiã alternatim pportionales erũt.

Propositio 17. Theorema.

Si magnitudines cõiunctæ fuerint proportionales, etiam separatæ proportionales erũt.

Propositio 18. Theorema.

Si magnitudines separatæ fuerint proportionales, etiam cõiunctæ erũt proportionales.

Propositio 19. Theorema.

Si fuerit totius alicuius magnitudinis, ad totam aliquam magnitudinem proportio ea, quæ ablata ad ablatam: erit etiam reliquæ ad reliquam proportio ea, quæ totius ad totam.

Πρότασις κ. θεώρημα.

Εὰν ἡ τρία μεγέθη, καὶ ἄλλα αὐτοῖς ἴσα τὸ πλῆθος Θ , σιῶδ'υο λαμβανόμενα, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς λόγῳ, δίσου δὲ τὸ πρῶτον τῷ τρίτῳ μείζον ἢ, καὶ τὸ τέταρτον τῷ ἕκτῳ, μείζον ἔσται, καὶ ἴσον, ἴσον, καὶ ἔλασσον, ἔλασσον.

Πρότασις κα. θεώρημα.

Εὰν ἡ τρία μεγέθη, καὶ ἄλλα αὐτοῖς ἴσα τὸ πλῆθος Θ , σιῶδ'υο λαμβανόμενα, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς λόγῳ, ἡ δὲ τετραραγμένη αὐτῶν ἡ ἀναλογία, δίσου δὲ τὸ πρῶτον τῷ τρίτῳ μείζον ἢ, καὶ τὸ τέταρτον, τῷ ἕκτῳ, μείζον ἔσται, καὶ ἴσον, ἴσον, καὶ ἔλασσον, ἔλασσον.

Πρότασις κβ. θεώρημα.

Εὰν ἡ ὀπποσίου μεγέθη, καὶ ἄλλα αὐτοῖς ἴσα τὸ πλῆθος Θ , σιῶδ'υο λαμβανόμενα καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς λόγῳ, καὶ δίσου, ἐν ταῖς αὐταῖς λόγῳ ἔσται.

Πρότασις κγ. θεώρημα.

Εὰν ἡ τρία μεγέθη, καὶ ἄλλα αὐτοῖς ἴσα τὸ πλῆθος Θ , σιῶδ'υο λαμβανόμενα ἐν ταῖς αὐταῖς λόγῳ, ἡ δὲ τετραραγμένη αὐτῶν ἡ ἀναλογία, καὶ δίσου ἐν ταῖς αὐταῖς λόγῳ ἔσται.

Πρότα-

Propositio 20. Theorema.

Si fuerint tres magnitudines, & aliæ totidem, & binæ in eadem proportione, & si ex æquo prima fuerit maior quàm tertia, erit etiam quarta maior quàm sexta, & si æqualis, æqualis: & si minor, minor. Hoc est:

Si fuerit proportio primæ magnitudinis ad secundam ea, quæ tertiæ ad quartam: fuerit verò etiam proportio secundæ ad quintam, quæ quartæ ad sextam. tum si fuerit prima maior quàm quinta, erit etiam tertia maior quàm sexta, &c.

Propositio 21. Theorema.

Si fuerint tres magnitudines, & aliæ totidem, binæ in eadem proportione, etiam si fuerit confusa ipsarum proportio: tamen si ex æquo prima fuerit maior quàm tertia, erit etiam quarta maior quàm sexta: & si æqualis, æqualis, & si minor, minor:

Propositio 22. Theorema.

Si fuerint quotlibet magnitudines, & aliæ totidem binæ in eadem proportione, etiã ex æquo in eadem erunt proportione.

Propositio 23. Problema.

Si fuerint magnitudines tres, & aliæ totidem binæ in eadem proportione, etiam si fuerit confusa illarum proportio: tamen ex æquo in eadem erunt proportione.

Πρότασις κδ. Θεώρημα.

Εὰν πρῶτον πρὸς δεύτερον, τὸν αὐτὸν ἔχη λόγον, καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον: ἔχη δὲ καὶ πέμπτον πρὸς δεύτερον τὸν αὐτὸν λόγον: καὶ ἕκτον πρὸς τέταρτον: καὶ σωτεθὲν πρῶτον ἔπέμπτον πρὸς δεύτερον, τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον, καὶ τρίτον ἔἕκτον πρὸς τέταρτον.

Πρότασις κε. Θεώρημα.

Εὰν τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον ᾗ, τὸ μέγιστον ἔστω ἐλάχιστον δύο τῶν λοιπῶν, μείζον ἄρα ἔστι.

Τέλος τῶν πέμπτων στοιχείων

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΕΚΤΟΝ.

ΟΡΟΙ.

Ομοια σχήματα διθύγραμμά ἐστιν, ὅσα τὰς τε γωνίας ἴσας ἔχῃ κατὰ μίαν, καὶ τὰς περὶ τὰς ἴσας γωνίας πλευρὰς, ἀνάλογον.

Ἀντιπεπληθότα δὲ σχήματά ἐστιν, ὅταν ἑκατέρω

τέρω

Propositio 24. Theorema.

Si magnitudo prima ad magnitudinem secundam, eam habuerit proportionem, quam tertia ad quartam, habuerit verò etiam quinta ad secundam eam proportionem: quam sexta ad quartam: tum coniuncta magnitudo prima cum quinta, eam habebit proportionem ad secundam, quam habet tertia cum sexta ad quartam.

Propositio 25. quinta.

Si quatuor magnitudines fuerint proportionales, earum maxima & minima reliquis duabus erunt maiores.

Finis libri quinti.

EVCLIDIS ELEMENTO-
rum Geometriæ liber sextus.

Definitiones.

S*imiles figurae rectilineae sunt, quae aequales habent angulos ad unum: & latera aequales angulos continentia aequalia.*

Reciprocae figurae sunt, quando in utraque figura

τέρω τῶν σχημάτων, ἡ γέμευσις τε καὶ ἐπόμενοι λόγοι ὧσιν.

Ἀκρον καὶ μέσον λόγον, ὁθεῖα τε μῆδαι λέγεται, ὅταν ἢ, ὡς ἡ ὅλη πρὸς τὸ μείζον τμήμα, ἔτως τὸ μείζον πρὸς τὸ ἔλαστον.

Υψὸς ἐστὶ πάντος σχήματος, ἢ ἀπὸ τῆς κερυφῆς ἔπι τὴν βάσιν, κάψετ ἀγομένη. Λόγος ἐκ λόγων συγκείσθαι λέγεται, ὅταν αἱ τῶν λόγων πληρότητες, ἐφ' ἑαυτὰς πολλαπλασιασθεῖσιν, ποιῶσιν τινος.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Πρότασις α. θεώρημα.

Τὰ τρίγωνα, καὶ τὰ παραλληλόγραμμα τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὑψὸς ὄντα, πρὸς ἀλλήλα ἔσιν, ὡς αἱ βάσεις.

Πρότασις β. θεώρημα.

Εὰν τρίγωνος παρά μιαν τῶν πλευρῶν ἀχθῆ τις ὁθεῖα παράλληλος, ἀνάλογον τεμῆταις τῶν τρίγωνος πλευρῶν. Καὶ εἰ αἱ τῶν τρίγωνος πλευραὶ ἀνάλογον τμηθῶσιν, ἢ ἔπι τὰς ῥυμας, ἔπι ζυγυμένη ὁθεῖα, παρὰ τὴν λοιπὴν ἔσται τοῦ τρίγωνος πλευρῶν, παράλληλος.

figura sunt antecedentes, & consequentes rationis termini.

Secundum rationem extremam & mediã dicitur linea recta esse secta, quando sic se habet ratio, ut tota ad maius segmentum, sic maius segmentum ad minus.

Vniuscuiusq; figuræ altitudo dicitur linea recta perpendicularis, ducta à vertice ad basim vsq;.

Ratio ex rationibus dicitur composita esse, si rationum quantitates inter se multiplicatæ aliquas fecerint.

Propositiones.

Propositio 1. Theorema.

Trianguli, & parallelogramma, quæ sub eadem sunt altitudine, proportionem inter se habent, ut & ipsæ bases.

Propositio 2. Theorema.

Si ad trianguli alicuius latus, ducta fuerit quædam linea recta æquedistans, tum ea proportionaliter secabit trianguli latera. Et si trianguli latera fuerint proportionaliter secta: tum linea recta ad sectiones ducta ad reliquum trianguli latus, erit æquedistans.

Pro-

Πρότασις γ. Πρόβλημα.

Εὰν τριγώνῳ γωνία δίχα τμηθῆ, ἢ δὲ τέμνηται πρὸς τὴν γωνίαν, ὁρθογώνια, τέμνηται καὶ πρὸς τὰς βάσεις, τὰ τῆς βάσεως, τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον, ταῖς λοιπαῖς, τῶν τριγώνων πλοῦραῖς. Καὶ ἐὰν τὰ τῆς βάσεως τμήματα, τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ταῖς λοιπαῖς τῶν τριγώνων πλοῦραῖς, ἢ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπιπέσει πρὸς τὴν ὀρθογώνια ὁρθογώνια, δίχα τέμνει πρὸς τὸν τριγώνου γωνίαν.

Πρότασις δ. Θεώρημα.

Τῶν ἰσογώνιων τριγώνων, ἀνάλογον εἰσὶν αἱ πλοῦραι, αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας: καὶ ὁμόλογοι, αἱ ὑπὸ τὰς ἴσας γωνίας ὑποτείνονται πλοῦραι.

Πρότασις ε. πρόβλημα.

Εὰν δύο τρίγωνα, τὰς πλοῦρας ἀνάλογον ἔχη: ἰσογώνια ἔσται τὰ τρίγωνα, καὶ ἴσας ἔξει τὰς γωνίας, ὑφ' αἷς, αἱ ὁμόλογοι πλοῦραι ὑποτείνονται.

Πρότασις ς. Πρόβλημα.

Εὰν δύο τρίγωνα, μίαν γωνίαν, μιᾶ γωνία ἴσην ἔχη, περὶ δὲ τὰς ἴσας γωνίας, τὰς πλοῦ-

Propositio 3. Theorema.

Si trianguli alicuius angulus fuerit dissectus in duas partes æquales : ipsaq; recta secans angulum , ipsam etiam basin secet : tum segmenta basis eandẽ habebũt proportionem cum reliquis trianguli lateribus. Et si segmenta basis eandem habuerint proportionem cũ reliquis trianguli lateribus : recta à vertice trianguli ad sectionem ducta : secat angulum trianguli in duas partes æquales.

Propositio 4. Theorema.

Trianguli qui æquales habent angulos : latera eorum quæ æquales continent angulos sunt proportionalia : latera æquales angulos subtendentia, sunt homologa.

Propositio 5. Theorema.

Si duo trianguli habuerint latera proportionalia , illi etiam æquianguli erunt , & anguli, quos latera homologa subtendũt, sunt æquales.

Propositio 6. Theorema.

Si alicuius trianguli vnus angulus fuerit æqualis vni angulo alterius trianguli : & la-

D tera

πλευρὰς ἀνάλογον, ἰσγώνια ἔσσι τὰ τρί-
γωνά, καὶ ἴσας ἔξει τὰς γωνίας, ὑφ' αἷς αἱ ὁμό-
λογοι πλευραὶ ἰσοτείνουσι.

Πρότασις ζ. θεώρημα.

Εὰν δύο τρίγωνα, μίαν γωνίαν, μιᾶ γωνία
ἴσην ἔχη, καὶ ἴ τὰς ἄλλας γωνίας, τὰς πλευ-
ρὰς ἀνάλογον, τῶν δὲ λοιπῶν ἐκατέρωθεν ἅμα
ἢ τι ἐλάσσονα, ἢ μὴ ἐλάσσονα ὀρθῆς, ἰσγώνια
ἔσσι τὰ τρίγωνα, καὶ ἴσας ἔξει τὰς γωνίας,
καὶ αἱ ἀνάλογον εἰσὶν αἱ πλευραί.

Πρότασις η. θεώρημα.

Εὰν ἐν ὀρθογωνίῳ τριγώνῳ, ἀπὸ τῆς ὀρ-
θῆς γωνίας, εἰς τὴν βᾶσιν κάθηται ἄκθῃ,
τὰ πρὸς τῇ καθέτῳ τρίγωνα, ὁμοία ἔσσι τῷ τε
ἅλῳ καὶ ἀλλήλοις.

Πρότασις θ. πρόβλημα.

Τῆς δοθείσης ὀθείας, τὸ περὶ αὐτὴν μέ-
τρον ἀφελεῖν.

Πρότασις ι. πρόβλημα.

Τὴν δοθεῖσαν ὀθείαν ἀτμηθῆναι, τῇ δοθεί-
σῃ ὀθείᾳ τετμημένη, ὁμοίως τεμεῖν.

Πρότα-

tera æquales illos angulos continentia sint proportionalia: eiusmodi trianguli æqualium sunt angulorum, & angulos quos homologa latera subtendunt, habent æquales.

Propositio 7. Theorema.

Si duorum triangulorum angulus vnus vni angulo fuerit æqualis: & latera alios angulos continentia sint proportionalia: & alterũ ex reliquis angulis vel minorem vel non minorem angulo recto habuerint: isti duo triaguli erunt æqualium angulorum, & angulos quos latera proportionalia continet, habent æquales.

Propositio 8. Theorema.

Si in triangulo rectangulo, ab angulo recto, ad basin ducta fuerit perpendicularis: tũ trianguli qui ad perpendicularem sunt positi, sunt similes toti triagulo, atq; etiã inter se.

Propositio 9. Problema.

Auferre ex data linea recta, eam partem, quæ auferenda præcipitur.

Propositio 10. Problema.

Datam lineam rectam non sectam similiter secare vt sectam.

Πρότασις ια. πρόβλημα.
 Δύο δοθεισῶν ὀρθῶν, τρίτῳ ἀνάλογον
 προσδρεῖν.

Πρότασις ιβ. Πρόβλημα.
 Τριῶν δοθεισῶν ὀρθῶν, τετάρτην ἀνάλο-
 γον προσευρεῖν.

Πρότασις ιγ. Πρόβλημα.
 Δύο δοθεισῶν ὀρθῶν, μέσην ἀνάλογον
 προσδρεῖν.

Πρότασις ιδ. Θεώρημα.
 Τῶν ἴσων τε, καὶ μίαν μιᾶ ἴσην, ἐχόντων
 γωνίαν παραλληλογραμμῶν, ἀντιπεπόν-
 θασιν αἱ πλευραὶ, αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας.
 Καὶ ὧν παραλληλογραμμῶν, μίαν μιᾶ ἴσην
 ἐχόντων γωνίαν, ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλε-
 ραὶ, αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας, ἴσαι ἐσὶν ἐκείνα.

Πρότασις ιε. Θεώρημα.
 Τῶν ἴσων, καὶ μίαν μιᾶ ἴσην ἐχόντων γω-
 νίαν, τριγώνων, ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλε-
 ραὶ, αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας. Καὶ ὧν τριγώ-
 νων μίαν μιᾶ ἴσην ἐχόντων γωνίαν, ἀντιπε-
 πόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς ἴσας γω-
 νίας, ἴσαι ἐσὶν ἐκείνα.

Πρότε-

Propositio 11. problema.

Duabus propositis lineis rectis tertiam proportionalem inuenire.

Propositio 12. Problema.

Tribus lineis rectis datis, quartam proportionalem inuenire.

Propositio 13. Problema.

Duabus datis lineis rectis mediam proportionalem inuenire.

Propositio 14. Theorema.

Parallelogrammorum equalium, & habentium vnum angulum vni angulo equallem latera equalles angulos continentia reciproca sunt. Et quorum parallelogrammorum habentium vnum angulum vni angulo equallem, reciproca sunt ea latera, quæ equalles angulos continent, illa etiam sunt equalia.

Propositio 15. Theorema.

Triangulorum equalium, & habentium vnum angulum, vni angulo equallem: latera equalles angulos continentia reciproca sunt. Et quorum triangulorum habentium vnum angulum vni angulo equallem, reciproca sunt latera equalles angulos continentia, equalles etiam erunt illi trianguli.

Πρότασις ις. Θεώρημα.

Εὰν τέσσαρες ὄρθειαι, ἀνάλογον ὡς, τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον, ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν μέσων περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ. Καὶ εἰ τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἢ, τῷ ὑπὸ τῶν μέσων περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ, αἱ τέσσαρες ὄρθειαι ἀνάλογον εἰσονται.

Πρότασις ιζ. Θεώρημα.

Εὰν τρεῖς ὄρθειαι ἀνάλογον ὡς, τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον, ἴσον ἐστὶ, τῷ ἀπὸ τῆς μέσης τετραγώνῳ. Καὶ εἰ τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἢ, τῷ ἀπὸ τῆς μέσης τετραγώνῳ, αἱ τρεῖς ὄρθειαι ἀνάλογον εἰσονται.

Πρότασις ιη. πρόβλημα.

Ἀπὸ τῆς δοθείσης ὄρθειας, τῷ δοθέντι ὀρθογώνῳ, ὁμοίον τε καὶ ὁμοίως κείμενον ὀρθογώνιον ἀναγράψαι.

Πρότασις ιθ. Θεώρημα.

Τὰ ὅμοια τρίγωνα πρὸς ἀλλήλα, ἐν διπλασίονι λόγῳ ἐστὶ, τῷ ὁμολόγων πλάσῶν.

Πρό-

Propositio 16. Theorema.

Si quatuor lineæ rectæ fuerint proportionales, rectangulum quod continetur duabus extremis, æquale est rectangulo, quod duabus medijs continetur. Et si rectangulum quod duabus extremis continetur, fuerit æquale rectangulo, quod continetur duabus medijs: quatuor istæ lineæ rectæ proportionales erunt.

Propositio 17. Theorema.

Si tres lineæ rectæ proportionales fuerint, rectangulum quod continetur duabus extremis: æquale est quadrato quod describitur à linea media. Et si rectangulum quod continetur duabus extremis, æquale est quadrato à media linea descripto, tres illæ rectæ proportionales erunt.

Propositio 18. Problema.

A data linea recta, dato rectilineo describere simile, & similiter positum rectilineum.

Propositio 19. Theorema.

Similes trianguli in dupla sunt ratione homologorum laterum.

Πρότασις κ. Θεώρημα.

Τὰ ὅμοια πολύγωνα, εἰς τὰ ὅμοια τρίγωνα διαιρεῖται, καὶ εἰς ἴσα τὸ πλῆθος, καὶ ὁμόλογα τοῖς ὅλοις, καὶ τὸ πολύγωνον, διπλασίονα λόγον ἔχει, ἢ ὡς ἡ ὁμόλογος πλάρᾳ, πρὸς τὴν ὁμόλογον πλάρᾳν.

Πρότασις κᾶ. Θεώρημα.

Τὰ τῶ αὐτῷ ὀρθογώνιῳ ὅμοια, καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ὅμοια.

Πρότασις κβ. Θεώρημα.

Εὰν τέσσαρες ὀρθεῖαι, ἀνάλογον ᾧσιν, καὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν ὀρθόγραμμα, ὁμοιά τε, καὶ ὁμοίως ἀναγεγραμμένα, ἀνάλογον ἔσται. Καὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν ὀρθόγραμμα, ὁμοιά τε καὶ ὁμοίως ἀναγεγραμμένα, ἀνάλογον ἦ, ὅτι αὐταὶ αἱ ὀρθεῖαι, ἀνάλογον ἔσονται.

Πρότασις κγ. Θεώρημα.

Τὰ ἰσογώνια παραλληλόγραμμα, πρὸς ἀλληλα λόγον ἔχει, τὸν συγκείμενον ἐκ τῶν πλάρῶν.

Πρότασις κδ. Θεώρημα.

Παντὸς παραλληλογραμμοῦ τὰ ὡς τὴν πλάρᾳν
διά-

Propositio 20. Theorema.

Figuræ multorum angulorum diuiduntur in similes triangulos, & numero æquales, & homologos totis, & figura multorum angulorum, ad figuram multorum angulorū duplicem habet rationem, quam latus homologon, ad latus homologon.

Propositio 21. Theorema.

Quæ eidem rectangulo sunt similia, etiam inter se sunt similia.

Propositio 22. Theorema.

Si quatuor lineæ rectæ fuerint proportionales, etiam rectilineæ figuræ similes, similiterq; ab eis descriptæ proportionales erunt. Et si rectilineæ figuræ similes, & ab his lineis rectis similiter descriptæ fuerint proportionales, etiã ipsæ lineæ rectæ, pportionales erūt.

Propositio 23. Theorema.

Parallelogramma æquales angulos habentia, proportionem inter se habent, ex lateribus compositam.

Propositio 24. Theorema.

Omnis parallelogrammi, quæ circa diametrum

διάμετρον παραλληλόγραμμου, ὁμοιά ἐστι, τῷ τε ὅλῳ, καὶ ἀλλήλοις.

Πρότασις κε. πρόβλημα.

Τῷ δοθέντι ἑυθυγράμμῳ, ὁμοιον, καὶ ἄλλῳ τῷ δοθέντι ἴσον τὸ αὐτὸ συστήσασθαι.

Πρότασις κς. Θεώρημα.

Εὰν ἀπὸ παραλληλογραμμοῦ, παραλληλόγραμμον ἀφαιρεθῆ, ὁμοίον τε τῷ ὅλῳ, καὶ ὁμοίως κείμενον, κεινὴν γωνίαν ἔχων αὐτῷ ὡς ἡ πῦρ αὐτῷ διάμετρον ἐστὶ τῷ ὅλῳ.

Πρότασις κζ. Θεώρημα.

Πάντων τῶν παρὰ πῦρ αὐτῷ εὐθείαν παραβαλλομένων παραλληλογραμμῶν, καὶ ἑλλειψῶντων εἶδει παραλληλογραμμοῖς, ὁμοίοις τε, καὶ ὁμοίως κειμένοις, τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας ἀναγκαζομένῳ, μέγιστόν ἐστι, τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας παραβαλλόμενον παραλληλόγραμμον, ὁμοιον ὄν, τῷ ἑλλείμματι.

Πρότασις κη. πρόβλημα.

Παρὰ πῦρ δοθείσαν εὐθείαν, τῷ δοθέντι ἑυθυγράμμῳ, ἴσον παραλληλόγραμμον παραβαλεῖν, ἑλλείπον εἶδος παραλληλογραμμῷ ὁμοίῳ ὄντι τῷ δοθέντι. Δεῖ δὴ τὸ διδόμενον εὐθ.

metrū sunt parallelogramma, similia sunt toti parallelogrammo, & inter se.

Propositio 25. Problema.

Data figura rectilinea similem, & alia figura rectilinea data eandem æqualem figuram rectilineam constituere.

Propositio 26. Theorema.

Si auferatur ex parallelogrammo aliud parallelogrammon simile, & similiter positum toti parallelogrammo, ita vt etiam communem cum ipso habeat angulum: erit circa eandem cum ipso diametro.

Propositio 27. Theorema.

Omnium parallelogrammorum quæ ad eandem lineam rectam applicantur, & deficiunt parallelogrammis figuris, similibus & similiter positis, parallelogrammon quod à dimidia describitur, atq; defectui simile est, erit maius eo, quod à dimidia describitur.

Propositio 28. problema.

Data lineæ rectæ, dato rectilineo æquale parallelogrammon applicare deficiens figura parallelogramma, simili data figuræ. Sed oportet illud rectilineum, cui æquale ponendum

εὐθύγραμμον, ὃ δὲ ἴσον παραβαλεῖν, μὴ
μείζον εἶναι, τῆ ἀπὸ τῆς ἡμισείας παραβαλ
λομένῃ, ὁμοίων ὄντων τῶν ἐλλημάτων, τοῦ
τε ἀπὸ τῆς ἡμισείας, καὶ ὃ δὲ ὅμοιον ἐλλεί
ωφν.

Πρότασις κθ. πρόβλημα.

Παρά τῷ δοθεῖσαν εὐθείαν, τῷ δοθέντι εὐ
θύγραμμῳ, ἴσον παραλληλόγραμμον πα
ραβαλεῖν, ὑπερβάλλον εἰς παραλληλο
γράμμῳ ὁμοίῳ τῷ δοθέντι.

Πρότασις λ. πρόβλημα.

Τῷ δοθεῖσαν εὐθείαν περὶ φασμένῳ, ἄ
κρον, καὶ μέσον λόγον τεμεῖν.

Πρότασις λα. θεώρημα.

Ἐν τοῖς ὀρθογωνίοις τριγώνοις, τὸ ἀπὸ τῆς,
τῷ ὀρθῆν γωνίαν, ὑποτέξεως πλάγῃ εἰ
δη, ἴσον ἐστὶ, τοῖς ἀπὸ τῶν, τῷ ὀρθῷ γω
νίαν περιεχσῶν πλάγῶν εἰδεσι, τοῖς ὁμοί
οις, ἢ ὁμοίως ἀναγξαφομένοις.

Πρότασις λβ. θεώρημα.

Ἐὰν δύο τρίγωνα ζῶ τεθῆ, κατὰ μίαν γω
νίαν, τὰς δύο πλάγῃς, ταῖς δυσὶ πλάγῃς,
ἀνάλογον ἔχοντα, ὡς τε, τὰς ὁμολόγους αὐ
τῶν

dum & applicandum est non esse maius rectilineo, quod à dimidia describitur istis defectibus existentibus similibus, eius quod à dimidia describitur, & eius cui simile deficere oportet.

Propositio 29. problema.

Data lineæ rectæ dato rectilineo applicare æquale parallelogrammon, quod excedit figura parallelogramma simili datæ figuræ rectilineæ.

Propositio 30. problema.

Datam lineam rectam extrema & media ratione secare.

Propositio 31. Theorema.

In datis triangulis rectangulis, figura quæ describitur à latere subtendente angulum illum rectum, æqualis est figuris, quæ describuntur à lateribus angulū illum rectum continentibus, similibus similiterq; descriptis.

Propositio 32. Theorema.

Si duo trianguli coniuncti ad unum angulum, habentesq; duo latera duobus lateribus proportionalia: ita ut latera homologa sint æque-

62. ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ

τῶν πλῆρῶς, καὶ παραλλήλους εἶναι, αἰ
λοιπαὶ τῶν τριγώνων πλῆρῶς, ἐπ' εὐθείας
ἔσονται.

Πρότεσις λγ'. Θεώρημα.

Εν τοῖς ἰσοῖς κύκλοις, αἱ γωνίαι, τὸν αὐτὸν
λόγον ἔχουσι, ταῖς περιφερείαις ἐφ' ἧν βε-
βήκασιν, εἰάντε πρὸς τοῖς κέντροις, εἰάντε πρὸς
ταῖς περιφερείαις, ὡς βεβήκαμεν. ἐπι δὲ χ
οἱ τομῆς, ἅτε πρὸς τοῖς κέντροις σιωισάμενοι.

Τέλος τοῦ ἐκ τοῦ στοιχείου.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ
ΕΒΔΟΜΟΝ.

ΟΡΟΙ.

Μονάς ἐστὶ, καθ' ἣν ὁ ἕκαστος τῶν ὄντων
ἐν λέγεται.

Ἀριθμὸς δὲ, τὸ ἕκαστον μονάδων συγκείμενον
πλήθος.

Μέρη ἐσὶν ἀριθμὸς ἀριθμῶν, ὁ ἐλάσσων
τοῦ μείζονος, ὅταν καταμετρηῖ τὸν μείζονα.
Μέρη δὲ, ὅταν μὴ καταμετρηῖ.

Πολλὰ

æquedistantia: tum reliqua triangulorum latera ἐπὶ ἐπιπέδου sunt posita.

Propositio 33. Theorema.

In circulis æqualibus anguli eandem habent rationem quam circumferentiæ in quibus consistunt: siue sint ad centra, siue ad circumferentias constituti, præterea & sectores ad centra scilicet constituti.

Finis libri sexti.

*EVCLIDIS ELEMENTO-
rum Liber Septimus.*

Definitiones.

V*nitatis est secundum quam unumquodque unum dicitur.*

Numerus verò multitudo ex unitatibus composita.

Numerus alterius numeri pars esse dicitur minor maioris: quando maiorem exactè metitur.

Numerus verò alterius numeri partes esse dicitur, quando non exactè metitur maiorem.

Nume

Πολλαπλάσι Θ δὲ, ὁ μείζων τῶν ἐλάττων Θ , ὅταν καλαμετρῆται ὑπὸ τῶν ἐλάττωνος.

Ἀριθμὸς δὲ ἀριθμὸς ἐστίν, ὁ δίχα διαμερούμενος Θ .

Περσῆτος δὲ, ὁ μὴ διαμερούμενος Θ δίχα. ἢ ὁ μονάδι διαφέρει δὲ τῶν ἀριθμῶν.

Ἀρπιάκις ἀρπῆτος ἀριθμὸς ἐστίν, ὁ ὑπὸ δὲ τῶν ἀριθμῶν μετρήμενος Θ , κατ' ἀρπὸν ἀριθμὸν.

Ἀρπιάκις δὲ περσῆτος ἐστίν, ὁ ὑπὸ ἀρπῆτος ἀριθμῶν μετρήμενος Θ , καὶ ὡς ἴσος ἀριθμὸν.

Περσῆτος δὲ ὡς ἴσος ἐστίν ἀριθμὸς, ὁ ὑπὸ ὡς ἴσος ἀριθμῶν μετρήμενος Θ , καὶ ἀπερσῆτος ἀριθμὸν.

Πρῶτος ἀριθμὸς ἐστίν, ὁ μονάδι μόνη μετρήμενος Θ .

Πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ἀριθμοὶ εἰσιν, οἱ μονάδι μόνη μετρήμενοι κοινῶν μέτρων.

Συώθετος ἀριθμὸς ἐστίν, ὁ ἀριθμῶν πινὶ μετρήμενος Θ .

Συώθετοι δὲ πρὸς ἀλλήλους, ἀριθμοὶ εἰσιν, οἱ ἀριθμῶν πινὶ μετρήμενοι κοινῶν μέτρων.

Ἀριθμὸς ἀριθμὸν πολλαπλασιάζειν λέγεται,

Numerus alterius numeri multiplex esse dicitur maior minoris: quando minor maiore exactè metitur.

Numerus par est, quem in duas partes aequales diuidere possumus.

Numerus verò impar, qui non potest diuidi in duas partes aequales: vel is qui vnitatem differt à numero pari.

Numerus pariter par est, quem par numerus per partem metitur.

Numerus pariter impar est, quem numerus par metitur per numerum imparem.

Numerus impariter impar est, què impar numerus per imparem metitur.

Numerus primus est, quem sola metitur vnitatis.

Numeri inter se primi sunt, quos sola vnitatis communi mensura metitur.

Numerus compositus est, quem numerus aliquis metitur.

Numeri inter se compositi, quos numerus aliquis communi metitur mensura.

Numerus numerum multiplicare dicitur,

E quan-

ζεται, ὅταν ὅσαι εἰσὶν ἐν αὐτῷ μονάδες, ποσω-
τάκις σωτεθῆ ὁ πολλαπλασιαζόμενος Θ , καὶ
γένηταί τις.

Ὅταν δὲ δύο ἀριθμοὶ πολλαπλασιάσαν-
τες ἀλλήλους, ποιῶσί τινα, ὁ γινόμενος Θ , ἐπίπε-
δος Θ καλεῖται.

Πλῆραι δὲ αὐτῶν, οἱ πολλαπλασιάσαντες
ἀλλήλους ἀριθμοὶ.

Ὅταν δὲ τρεῖς ἀριθμοὶ, πολλαπλασιά-
σαντες ἀλλήλους, ποιῶσί τινα, ὁ γινόμενος Θ ,
σερεὸς καλεῖται.

Πλῆραι δὲ αὐτῶν, οἱ πολλαπλασιάσαν-
τες ἀριθμοὶ.

Τετραγώνος Θ ἀριθμὸς ἐστίν, ὁ ἰσάκις ἴσος
ἢ ὁ ὑπὸ δύο ἴσων ἀριθμῶν περιεχόμενος Θ .

Κύβου Θ δὲ, ὁ ἰσάκις ἴσος ἰσάκις. ἢ ὁ ὑπὸ
τριῶν ἴσων ἀριθμῶν περιεχόμενος Θ .

Ἀριθμοὶ ἀνάλογόν εἰσιν, ὅταν ὁ πρῶτος
τοῦ δευτέρου, καὶ ὁ τρίτος Θ , τοῦ τετάρτου ἰ-
σάκις ἢ πολλαπλασί Θ , ἢ τὸ αὐτὸ μέρος Θ ,
ἢ τὰ αὐτὰ μέρη ᾖσιν.

Ἐμοιο-

quando quot in ipso multiplicante fuerint unitates, toties componitur numerus multiplicandus & producitur aliquis numerus.

Quando verò duo numeri sese mutuo multiplicantes producant aliquem, numerus qui producitur appellatur planus.

Latera vero eius sunt, numeri sese mutuo multiplicantes.

Si verò tres numeri sese mutuo multiplicantes produxerint aliquem numerum: is qui fit solidus nominatur.

Eius verò latera sunt numeri, sese mutuo multiplicantes.

Numerus quadratus est, qui æqualiter est æqualis: vel qui ex duorum æqualium numerorum multiplicatione fit.

Numerus verò cubus dicitur qui æqualiter æqualis est, æqualiter: id est qui fit ex multiplicatione trium æqualium numerorum.

Numeri proportionales sunt, quando primus secundi, & tertius quarti æqualiter fuerit multiplex, aut eadē pars, aut eadē partes.

E. ij Simi-

Ομοιοὶ ἐπίπεδοι καὶ στερεοὶ ἀριθμοὶ εἰσιν,
οἱ ἀνάλογον ἔχοντες τὰς πλάτους.

Τέλει ὁ ἀριθμὸς ἐστίν, ὁ τοῖς ἑαυτοῦ μερέσιν
ἴσος ὢν.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Πρότασις α. Θεώρημα.

Ἐὰν δύο ἀριθμῶν ἀνίσων ἐκκεκμημένων, ἀν-
θυφαιρῶμεν ἀεὶ ἕτεράσων ἀπὸ τοῦ μεί-
ζονος, ὁ λοιπὸς μὲν ἔστω, μηδέποτε κἄμειρη, τὸν
πρὸς ἑαυτοῦ, ἕως ὅτε ληφθῆ μονάς, οἱ ἐξ ἀρχῆς
ἀριθμοὶ, πρῶτον πρὸς ἀλλήλους ἔσονται.

Πρότασις β. πρόβλημα.

Δύο ἀριθμῶν δοθέντων, μὴ πρώτων πρὸς
ἀλλήλους, μέγιστον αὐτῶν κοινὸν μέτρον εὐρεῖν.

Πρότασις γ. Θεώρημα.

Τριῶν ἀριθμῶν δοθέντων, μὴ πρώτων
πρὸς ἀλλήλους, τὸ μέγιστον αὐτῶν κοινὸν μέ-
τρον εὐρεῖν.

Πρότασις δ. Θεώρημα.

Πᾶς ἀριθμὸς, παντὸς ἀριθμοῦ, ὁ ἐλάσσων
τοῦ μείζονος, ἢ τοῦ μέρους ἐστίν ἢ μέρος.

Πρότασις ε. Θεώρημα.

Ἐὰν ἀριθμὸς ἀριθμοῦ μέρος ἢ, καὶ ἕτερος

ΕΤΕ-

Similes plani & solidi numeri sunt, qui latera habent proportionalia.

Numerus perfectus est, qui partibus sui ipsius est æqualis.

Propositiones.

Propositio 1. Theorema.

Si duobus numeris inæqualibus propositis, semper minor à maiore auferatur: & tandem is qui relinquitur, præcedentem nõ amplius exacte metiatur, donec sumatur unitas, numeri ab initio propositi primi inter se sunt.

Propositio 2. problema.

Duobus propositis numeris non primis inter se: inuenire mæximam eorum communem mensuram.

Propositio 3. problema.

Tribus propositis numeris nõ primis inter se: mæximam eorũ communẽ mæsuram inuenire.

Propositio 4. Theorema.

Omnis numerus, omnis numeri minor maioris: vel est pars, vel partes.

Propositio 5. Theorema.

Si numerus numeri pars fuerit, & alter al-

ἑτέρω, τὸ αὐτὸ μέρος, καὶ ὡσαυμφοτέρως συναμφοτέρως, τὸ αὐτὸ μέρος ἔσται, ὡς ὁ εἰς ἑνός. Πρότασις ε. Θεώρημα.

Εὰν ἀριθμὸς ἀριθμῶν μέρη ἦ, ἢ ἕτερον ἑτέρω, τὰ αὐτὰ μέρη ἦ, καὶ ὡσαυμφοτέρως ὡσαυμφοτέρως, τὰ αὐτὰ μέρη ἔσται, ὡς ὁ εἰς ἑνός. Πρότασις ζ. Θεώρημα.

Εὰν ἀριθμὸς, ἀριθμῶν μέρος ἦ, ὡς ἀφαιρεθεὶς ἀφαιρεθέντι, καὶ ὁ λοιπὸς τῶν λοιπῶν, τὸ αὐτὸ μέρος ἔσται, ὡς ὁ ὅλον τῶν ὅλων.

Πρότασις η. Θεώρημα.

Εὰν ἀριθμὸς ἀριθμῶν μέρη ἦ, ὡς ἀφαιρεθεὶς ἀφαιρεθέντι, καὶ ὁ λοιπὸς τοῦ λοιποῦ, τὰ αὐτὰ μέρη ἔσται, ὡς ὁ ὅλον τοῦ ὅλου. Πρότασις θ. Θεώρημα.

Εὰν ἀριθμὸς ἀριθμῶν μέρος ἦ, καὶ ἕτερον ἑτέρω, τὸ αὐτὸ μέρος, καὶ ἐναλλάξ, ὁ μέρος ἐστὶν ἢ μέρη, ὁ πρῶτον τῶν τρίτων, τὸ αὐτὸ μέρος ἔσται, ἢ τὰ αὐτὰ μέρη, καὶ ὁ δευτέρω ἢ τετάρτων.

Πρότασις ι. Θεώρημα.

Εὰν ἀριθμὸς ἀριθμῶν μέρη ἦ, καὶ ἕτερον ἑτέρω, τὰ αὐτὰ μέρη, καὶ ἐναλλάξ, ἢ μέρη ἐστὶν,

terius eadem pars etiam additus additi eadē pars erit, quæ vnus vnus.

Propositio 6. Theorema.

Si numerus numeri partes sit, & alter alterius eadem partes, etiam additus additi eadem partes erit, quæ est vnus vnus.

Propositio 7. Theorema.

Si numerus numeri pars sit, quæ pars est numerus ablati, numeri ablati: etiam reliquus reliqui eadē pars erit, quæ totus totius.

Propositio 8. Theorema.

Si numerus alterius numeri fuerit partes, quæ partes est numerus ablati, numeri ablati, etiam reliquus numerus reliqui numeri eadem partes erit, quæ partes est totus totius.

Propositio 9. Theorema.

Si numerus alterius numeri pars fuerit, & alter alterius eadē pars, tum permutatim quæ pars est, vel partes primus tertij: eadem pars vel partes est, secundus quarti.

Propositio 10. Theorema.

Si numerus alterius numeri fuerit partes, et alter alterius eadē partes, etiam permuta-

εἶναι, ὁ πρῶτος τῶ τρίτου, ἢ μέροσ, τὰ αὐτὰ μέ-
ροσ ἔσται, καὶ ὁ δεύτεροσ τῶ πέταρτου, ἢ μέροςσ.

Πρότασις ια. Θεώρημα.

Εὰν ἢ ὡσ ὅλοσ πρὸσ ὅλον, ἔτωσ ἀφαιρεθεῖσ
πρὸσ ἀφαιρεθέντα, ἔ ὅλοιωσ πρὸσ τὸν λοι-
πὸν ἔσται, ὡσ ὅλοσ, πρὸσ ὅλον.

Πρότασις ιβ. πρόβλημα.

Εὰν ὡσιν ὀποσσοιωῦ δξριθμοὶ ἀνάλογον, ἔ-
σται ὡσ εἶσ τῶν ἠγερμένων, πρὸσ ἓνα τῶν ἐπο-
μένων, ἔτωσ ἅπαντεσ οἱ ἠγερμένοι, πρὸσ ἅ-
παντασ ἔστω ἔπομένησ.

Πρότασις ιγ. Θεώρημα.

Εὰν τέσσαρεσ δξριθμοὶ, ἀνάλογον ὡσι, καὶ
ἐναλλάξ ἀνάλογον ἔσονται.

Πρότασις ιδ. Θεώρημα.

Εὰν ὡσιν ὀποσσοιωῦ δξριθμοὶ, καὶ ἄλλοι αὐ-
τοῖσ ἴσοι τὸ πλῆθοσ, σὺ δύο λαμβανόμενοι,
ἔ ἐν ταῖ αὐταῖ λόγῳ, ἔ δίωσ, ἐν ταῖ αὐταῖ λό-
γῳ ἔσονται.

Πρότασις ιε. Θεώρημα.

Εὰν μονάσ δξριθμὸν πῖνα μετρηῖ, ἰσάκισ δὲ
ἔπεροσ ἀριθμὸσ, ἄλλον πῖνα ἀριθμὸν μετρηῖ,
ἔ ἐναλ-

tim quæ partes est primus tertij vel pars, eadem partes secundus erit quarti vel pars.

Propositio 11. Theorema.

Si fuerit vt numerus totus ad numerum totum, ita ablati numerus ad ablatum: etiam reliquus ad reliquum erit vt totus numerus ad numerum totum.

Propositio 12. Theorema.

Si quotcunq; fuerint numeri proportionales, erit vt unus ex antecedentibus: ad vnum ex consequentibus: ita omnes antecedentes, ad omnes consequentes.

Propositio 13. Theorema.

Si quatuor numeri fuerint proportionales, etiam permutatim proportionales erunt.

Propositio 14. Theorema.

Si fuerint quotcunq; numeri, & alij his æquales numero bini collati & in eadem proportione & iam ex æquo in eadem erunt proportione.

Propositio 15. Theorema.

Si vnitas aliquem metitur numerum, æqualiter verò alius quispiam numerus, alium

E v nume-

καὶ ἐναλλάξ, ἰσάκεις ἡ μονάς, τὸν τρίτον ἀριθμὸν μετρήσῃ, καὶ ὁ δεύτερος \odot τέταρτον.

Πρότασις ις. θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμοὶ, πολλαπλασιάσαντες ἀλλήλους, ποιῶσιν ἕνα, οἱ γινόμενοι ἐξ αὐτῶν, ἴσοι ἀλλήλοις ἔσονται.

Πρότασις ιζ. θεώρημα.

Εὰν ἀριθμὸς, δύο ἀριθμοὺς πολλαπλασιάσῃ, ποιῆ ἕνα, οἱ γινόμενοι ἐξ αὐτῶν, τὸν αὐτὸν λόγον ἔχουσι τοῖς πολλαπλασιασθεῖσιν.

Πρότασις ιη. θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμοὶ, ἀριθμὸν ἕνα πολλαπλασιάσαντες, ποιῶσιν ἕνα, οἱ γινόμενοι ἐξ αὐτῶν, τὸν αὐτὸν ἔχουσι λόγον, τοῖς πολλαπλασιασθεῖσιν.

Πρότασις ιθ. θεώρημα.

Εὰν τέσσαρες ἀριθμοὶ, ἀνάλογον ᾧσιν, ὁ ἐκ τοῦ πρώτου καὶ τετάρτου, γινόμενος \odot ἀριθμὸς, ἴσος ἔσται, τῷ ἐκ τῶν δευτέρου καὶ τρίτου γινόμενῳ ἀριθμῷ. Καὶ εἰ ὁ ἐκ τῶν πρώτου καὶ τετάρτου, γινόμενος \odot ἀριθμὸς, ἴσος ἦ
τῷ

numerum metiatur : tum permutatim unitas æqualiter metietur numerum tertium, & secundus quartum.

Propositio 16. Theorema.

Si duo numeri sese mutuò multiplicantes produxerint aliquos, numeri ex eiusmodi multiplicatione facti, æquales inter se sunt.

Propositio 17. Theorema.

Si numerus aliquis duos numeros multiplicat, tum numeri ex eiusmodi multiplicatione facti, eandem habebunt quam multiplicati rationem.

Propositio 18. Theorema.

Si duo numeri aliquem multiplicauerint numerum, & producant aliquos, numeri producti ex horum multiplicatione eandem quàm multiplicantes, habebunt rationem.

Propositio 19. Theorema.

Si quatuor numeri fuerint proportionales, numerus qui fit ex multiplicatione primi in quartum, erit æqualis ei qui producitur ex multiplicatione secundi in tertium : & si numerus ex multiplicatione primi in quartum factus

τῶν ἐκ τοῦ δευτέρου καὶ τρίτου, οἱ τέσσαρες ἀριθμοὶ, ἀνάλογον ἔσονται.

Πρότασις κ. θεώρημα.

Εὰν τρεῖς ἀριθμοὶ, ἀνάλογον ᾦσιν, ὁ ὑπὸ τῶν ἄκρων, ἴσος ᾖ ἐς τὴν ἀπὸ τῆς μέσου. εἰ δὲ ὁ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσος ᾦ, τὰ ἀπὸ τοῦ μέσου, οἱ τρεῖς ἀριθμοὶ, ἀνάλογον ἔσονται.

Πρότασις κα. θεώρημα.

Οἱ ἐλάχιστοι ἀριθμοὶ, τῶν, τὸν αὐτὸν λόγον ἔχόντων αὐτοῖς, μετρεῖσιν, οὗ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντας αὐτοῖς, ἰσάκεις, ὅ, τε μείζων τὸν μείζονα, καὶ ὀλίγων, τὸν ὀλίγονα.

Πρότασις κβ. θεώρημα.

Εὰν ᾧσι τρεῖς ἀριθμοὶ, καὶ ἄλλοι αὐτοῖς ἴσοι τὸ πλεονάζον, συνδυο λαμβανόμενοι, καὶ ἐν τῶν αὐτῶν λόγῳ, ἢ δὲ τετραγαμένη αὐτῶν ἢ ἀναλογία, καὶ δίσπου ἐν τῶν αὐτῶν λόγῳ ἔσονται.

Πρότασις κγ. θεώρημα.

Οἱ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ἀριθμοὶ, ἐλάχιστοί εἰσι, τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἔχόντων αὐτοῖς.

Πρότα-

fuerit equalis ei, qui fit ex multiplicatione secundi in quartum, tum quatuor illi numeri erunt proportionales.

Propositio Vigesima.

Si tres numeri fuerint proportionales, numerus ex multiplicatione extremorum factus equalis est quadrato numeri medij, & si numerus ex multiplicatione extremorum factus, equalis est quadrato numeri medij, tres illi numeri erunt proportionales.

Propositio 21. Theorema.

Minimi numeri eandem habentes rationem metiuntur numeros eandem cum ipsis habentes rationem equaliter: maior maiorem, & minor minorem.

Propositio 22. Theorema.

Si fuerint tres numeri & alij numeri aequales, bini collati & in eadem ratione, sit verò illorum proportio perturbata: tum ex aequo in eadem erunt ratione.

Propositio 23. Theorema.

Numeri primi inter se, sunt minimi eorum qui eandem cum ipsis habent rationem.

Pro-

Πρότασις κδ. Θεώρημα.

Οἱ ἐλάχιστοι ἀριθμοὶ, τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἔχόντων αὐτοῖς, πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν.

Πρότασις κε. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμοὶ, πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ᾦσιν, ὁ τὸν ἓνα αὐτῶν μετρῶν ἀριθμὸς, πρὸς τὸν λοιπὸν, πρῶτος ἔσται.

Πρότασις κς. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμοὶ, πρὸς ἓνα ἀριθμὸν πρῶτοι ᾦσιν, καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν γινόμενος, πρὸς τὸν αὐτὸν πρῶτος ἔσται.

Πρότασις κζ. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμοὶ, πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ᾦσιν, ὁ ἐκ τῶν αὐτῶν γινόμενος, πρὸς τὸν λοιπὸν, πρῶτος ἔσται.

Πρότασις κη. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμοὶ, πρὸς δύο ἀριθμούς, ἀμφοτέροι, πρὸς ἐκάτερον, πρῶτοι ᾦσι: καὶ οἱ ἐξ αὐτῶν γινόμενοι, πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ἔσονται.

Πρότασις κθ. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμοὶ, πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ᾦσι,

Propositio 24. Theorema.

Numeri minimi eorum qui eandem cum ipsis habent proportionē: primi inter se sunt.

Propositio 25. Theorema.

Si duo numeri primi inter se fuerint: is qui vnū ex illis metitur: primus erit ad reliquū.

Propositio 26. Theorema.

Si duo numeri ad vnum fuerint primi: tū is qui producitur ex horum multiplicatione ad eundem quoq; primus erit.

Propositio 27. Theorema.

Si duo numeri primi inter se fuerint, is qui fit ex multiplicatione vnus illorum duorum: primus erit ad reliquum.

Propositio 28. Theorema.

Si duo numeri ad duos numeros vterq; ad vtrunq; primi fuerint: tum qui ex horum fiunt multiplicatione etiā primi inter se erunt.

Propositio 29. Theorema.

Si duo numeri primi inter se fuerint: & vterq;

ᾧσι, καὶ πολλαπλασιάσαις ἐκάτερον Θ ἑαυτὸν, ποιῆτινά, οἱ γινόμενοι ἐξ αὐτῶν, ὡς ᾧτι πρὸς ἀλλήλους ἔσονται. Καὶ οἱ ἐξ ἀρχῆς, ὅτῳ γινόμενος πολλαπλασιάσαντες, ποιῶσί τινας, κακεῖνοι ὡς ᾧτι πρὸς ἀλλήλους ἔσονται, καὶ αἰεὶ ὡς ὅτῳ ἄκρας τοῦτο συμβαίνει.

Πρότασις λ. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμοὶ ὡς ᾧτι πρὸς ἀλλήλους ᾧσι, καὶ ζυγαμφοτέρων Θ πρὸς ἐκάτερον αὐτῶν, ὡς ᾧτις ἔσται. καὶ εἰ σωμαμφοτέρων Θ πρὸς ἓνα τινὰ αὐτῶν ὡς ᾧτις ἢ, καὶ οἱ ἐξ ἀρχῆς ἀριθμοὶ, ὡς ᾧτι πρὸς ἀλλήλους ἔσονται.

Πρότασις λα. Θεώρημα.

Ἄπας πρῶτον Θ ἀριθμὸς, πρὸς ἅπαντα ἀριθμὸν, ὃν μὴ μετρεῖ, πρῶτός ἐστιν.

Πρότασις λβ. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμοὶ, πολλαπλασιάσαντες ἀλλήλους ποιῶσί τινα, τὸν δὲ γινόμενον ἐξ αὐτῶν, μετρεῖ τις πρῶτον Θ ἀριθμὸς, καὶ ἓνα τῶν ἐξ ἀρχῆς μετρήσῃ.

Πρότασις λγ. Θεώρημα.

Ἄπας σμύθετον Θ ἀριθμὸς, ὑπὸ πρῶτον πινὸς ἀριθμοῦ μετρεῖται.

Πρότα-

Uterq; seipsum multiplicet ac producat aliquem numerum tum producti ex his numeri etiam primi inter se erunt, & si ab initio propositi numeri hos multiplicantes producant alios: etiam illi primi inter se erunt, id perpetuo circa extremos contingit numeros.

Propositio 30. Theorema.

Si duo numeri primi inter se fuerint, & uterq; simul ad utrūq; illorum erit primus, & si uterq; simul ad vnum aliquem illorū est primus, etiam numeri ab initio propositi, primi inter se erunt.

Propositio 31. Theorema.

Omnis numerus ad omnem numerum quē non metitur primus est.

Propositio 32. Theorema.

Si duo numeri sese multiplicantes producant aliquem, eumq; metiatur aliquis numerus primus, tum etiā vnum ex ijs qui ab initio erant propositi metietur.

Propositio 33. Theorema.

Omnem compositum numerum, aliquis primus numerus metitur.

Πρότασις λδ. Θεώρημα.

Απας ἀριθμὸς, ἢτοι πρῶτός ἐστιν, ἢ ὑπὸ
πρώτου ἴνους ἀριθμοῦ μετρεῖται.

Πρότασις λε. Θεώρημα.

Ἀριθμῶν δοθέντων ὀπισσωνοῦ, εἶρεῖν
οὐδὲν ἐλάχιστος, τῶν τ' αὐτὸν λόγον ἐχούων
αὐτοῖς.

Πρότασις λς. Θεώρημα.

Δύο ἀριθμῶν δοθέντων, εἶρεῖν ὄν ἐλάχι-
στον μετρεῖσιν ἀριθμόν.

Πρότασις λζ. Θεώρημα.

Ἐὰν δύο ἀριθμοὶ, ἀριθμόν ἵνα μετρεῶσι,
καὶ ὁ ἐλάχιστος, ὑπὸ αὐτ' μετρεῖται Θ , τὸν
αὐτὸν μετρήσῃ.

Πρότασις λη. Θεώρημα.

Τριῶν ἀριθμῶν δοθέντων, εἶρεῖν ὄν ἐλά-
χιστον μετρεῖσιν ἀριθμόν.

Πρότασις λθ. Θεώρημα.

Ἐὰν ἀριθμὸς, ὑπὸ ἴνους ἀριθμοῦ μετρεῖ-
ται, ὁ μετρεῖται Θ , ὁμώνυμον μέρ Θ ἔξει τῶν
μετροῦν.

Πρότασις μ. Θεώρημα.

Ἐὰν ἀριθμὸς, μέρ Θ ἔχη ὀμοῦ, ὑπὸ ὁ-
μω-
μωνύ-

Propositio 34. Theorema.

Omnis numerus, aut primus est, aut primus numerus eum metitur.

Propositio 35. Theorema.

Quotcunq; numeris datis, inuenire minimos eandem cum ipsis habentes proportionē.

Propositio 36. Theorema.

Duobus propositis numeris inuenire minimum quem metiantur.

Propositio 37. Theorema.

Si duo numeri metiantur vnum aliquem numerum, tum minimus quem illi metiuntur metietur etiam eundem.

Propositio 38. problema.

Tribus propositis numeris, inuenire minimum quem metiantur.

Propositio 39. Theorema.

Si aliquem numerum metiatur aliquis alius numerus is quem alter metitur habebit cum eo qui metitur alterum numero partem denominationis eiusdem.

Propositio 40. Theorema.

Si numerus aliquis quamcūq; habuerit par-

F ij tem

μωνύμου ἀριθμοῦ μετρηθήσεται τὰ μέρη,

Πρότασις μα. πρόβλημα.

Ἀριθμὸν δορεῖν, ὃς ἐλάχιστος ὢν, ἔξῃ τὰ
δοθέντα μέρη.

Τέλος τοῦ ἑβδόμου βιβλίου.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ὈΓΔΩΘΕΝ.

Πρότασις α. θεώρημα.

Εὰν ὡσιν ὅσοιδηποτῶν ἀριθμοὶ ἐξῆς ἀνά-
λογον, οἱ δ' ἄκροι αὐτῶν πρῶτοι πρὸς
ἀλλήλους ὡσιν: ἐλάχιστοι εἰσὶ τῶν τὸν αὐτὸν
λόγον ἐχόντων αὐτοῖς.

Πρότασις β. πρόβλημα.

Ἀριθμὸς δορεῖν ἐξῆς ἀνάλογον ἐλαχί-
στους, ὅσους ὁπλιᾶξιμους ἐν τῷ δοθέντι λόγῳ.

Πρότασις γ. θεώρημα.

Εὰν ὡσιν ὅποσιουῶ ἀριθμοὶ ἐξῆς ἀνάλο-
γον, ἐλάχιστοι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐχόντων
αὐτοῖς, οἱ ἄκροι αὐτῶν, πρῶτοι πρὸς ἀλλή-
λους εἰσιν.

Πρότα-

tem cum aliquis alius numerus eiusdem cum parte denominationis metietur eum.

Propositio 14. problema.

Numerum inuenire, qui cum sit minimus, habeat in se partes datas.

Finis Libri Septimi.

E V C L I D I S E L E M E N T O -
R V M L I B E R O C T A V V S .

S Propositio 1. Theorema.

Si fuerint quotcunq; numeri continue proportionales, atq; numeri extremi eorum inter se sint primi: tum erunt minimi eorum, qui eandem habent rationem.

Propositio 2. problema.

Numeros continue proportionales minimos inuenire, quotquot aliquis valet, in data proportione.

Propositio 3. Theorema.

Si aliquot numeri continue proportionales fuerint, minimi eorum qui in eadem sunt proportione, extremi eorum primi inter se sunt.

Πρότασις δ. πρόβλημα.

Λόγων ὁμοθέντων ὁποσωνῶν ἐν ἐλαχίστοις ἀριθμοῖς ἀριθμὸς δορεῖν ἐξῆς ἐλαχίστος ἐν τοῖς δοθεῖσι λόγοις.

Πρότασις ε. Θεώρημα.

Οἱ ὁπίπεδοι ἀριθμοὶ πρὸς ἀλλήλους λόγον ἔχουσι τὸν συγκείμενον ἐκ τῶν πλοσῶν.

Πρότασις ς. Θεώρημα.

Εὰν ὣσιν ὁπόσοιου ἄριθμοὶ ἐξῆς ἀνάλογον, ὁ δὲ πρῶτος τὸν δεύτερον μὴ μετρεῖ· ἔδ' ἄλλ' ἔδειξ' ἔδ' ἐνα μετρήσῃ.

Πρότασις ζ. Θεώρημα.

Εὰν ὣσιν ὁπόσοι ἄριθμοὶ ἐξῆς ἀνάλογον, ὁ δὲ πρῶτος τὸν ἑχάλον μετρεῖ, καὶ τὸν δεύτερον μετρήσῃ.

Πρότασις η. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμῶν μετὰξὺ καὶ τὸ συνεχές, ἀνάλογον ἐμπίπῃωσιν ἀριθμοὶ, ὅσοι εἰς αὐτῶν μετὰξὺ κατὰ τὸ συνεχές, ἀνάλογον ἐμπίπῃουσιν ἀριθμοὶ, τοσῶτοι, καὶ εἰς αὐτὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντας αὐτοῖς, μετὰξὺ κατὰ τὸ συνεχές, ἀνάλογον ἐμπεσιῶται.

πρότα

Propositio 4. problema.

Datis proportionibus aliquot in minimis numeris, inuenire numeros continue minimos in datis proportionibus.

Propositio 5. Theorema.

Numeri plani proportionem inter se habent ex lateribus eorum compositam.

Propositio 6. Theorema.

Si fuerint aliquot numeri continue proportionales & primus non metiatur secundum: neq; quispian alius quempiã metietur.

Propositio 7. Theorema.

Si fuerint aliquot numeri continue proportionales, & primus metiatur postremum: etiam metietur secundum.

Propositio 8. Theorema.

Si inter duos numeros continue proportionales incidant numeri: quotcunq; inter ipsos incident continue proportionales, totidem incident inter eos qui continue proportionales cum ipsis eandem habent proportionem.

Πρότασις θ. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμοὶ, πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ὡς, καὶ εἰς αὐτῶν μετὰξὺ κατὰ τὸ συνεχές ἀνάλογον ἐμπίπῃωσιν ἀριθμοὶ, ὅσοι εἰς αὐτῶν μετὰξὺ κατὰ τὸ συνεχές ἀνάλογον ἐμπίπῃουσιν ἀριθμοὶ, τοσοῦτοι καὶ ἑκατέρω αὐτῶν καὶ μονάδ Θ ἐξῆς μετὰξὺ κατὰ τὸ συνεχές, ἀνάλογον ἐμπέροῦται.

Πρότασις ι. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμῶν καὶ μονάδ Θ μετὰξὺ κατὰ τὸ συνεχές, ἀνάλογον ἐμπίπῃωσιν ἀριθμοὶ, ὅσοι ἑκατέρω αὐτῶν, ἢ μονάδ Θ ἐξῆς μετὰξὺ κατὰ τὸ συνεχές, ἀνάλογον ἐμπίπῃουσιν ἀριθμοὶ, τοσοῦτοι καὶ εἰς αὐτῶν μετὰξὺ κατὰ τὸ συνεχές, ἀνάλογον ἐμπέροῦται.

Πρότασις ια. Θεώρημα.

Δύο τετραγώνων ἀριθμῶν, εἰς μέσ Θ ἀνάλογός ἐστιν ἀριθμός. καὶ ὁ τετράγωνος Θ , πρὸς τὸν τετράγωνον, διπλασίονα λόγον ἔχει, ἢ ὡς ἡ πλάτος, πρὸς τὴν πλάτος.

Πρότασις ιβ. Θεώρημα.

Δύο κύβων ἀριθμῶν, δύο μέσοι ἀνάλογον εἰσὶν ἀριθμοὶ: καὶ ὁ κύβος Θ πρὸς τὸν κύβον,

Propositio 9. Theorema.

Si duo numeri primi inter se sunt, & inter ipsos continue proportionales incidant numeri: quot inter ipsos continue proportionales incidunt numeri, tot et inter utrunq; ipsorum & unitatē continue proportionales incident.

Propositio 10. Theorema.

Si inter duos numeros & unitatem continue proportionales incidant numeri: quot inter utrunq; ipsorum & unitatem continue proportionales incidunt numeri: tot inter ipsos continue proportionales incident.

Propositio 11. Theorema.

Duorum quadratorum numerorum unus est numerus medius proportionalis: & quadratus ad quadratum duplicatam habet rationem, quam latus ad latus.

Propositio 12. Theorema.

Duorum cuborum numerorum, duo medij proportionales numeri sunt; & cubus ad cubum

F v bum

βον, τριπλασίονα λόγον ἔχει, ἢ ὡς ἡ πλάρᾳ πρὸς τὴν πλάραν.

Πρότασις ιγ. Θεώρημα.

Εὰν ὦσιν ὅσοιδη ποιοῦν ἀριθμοὶ ἐξ ἧς ἀνάλογον, καὶ πολλὰ πλάσιας ἐκαστος ἐαυτὸν, ποιῆ πινας, οἱ γρόμμοι ἐξ αὐτῶν, ἀνάλογον ἔσοντα. Καὶ εἰάν οἱ ἐξ ἀρχῆς, ὅν γρομένους πολλὰ πλάσιασαντες, ποιῶσί πινας, καὶ αὐτοὶ ἀνάλογον ἔσοντα. Καὶ αἰεὶ περὶ ὅν ἀκροῦς τοῦτο συμβαίνει.

Πρότασις ιδ. Θεώρημα.

Εὰν τετράγωνον \odot τετράγωνον μετρή, καὶ ἡ πλάρᾳ τὴν πλάραν μετρήσῃ. Καὶ εἰάν ἡ πλάρᾳ, τὴν πλάραν μετρή, καὶ ὁ τετράγωνον \odot τὸν τετράγωνον μετρήσῃ.

Πρότασις ιε. Θεώρημα.

Εὰν κύβον \odot ἀριθμὸς, κύβον ἀριθμὸν μετρή, καὶ ἡ πλάρᾳ τὴν πλάραν μετρήσῃ. Καὶ εἰάν ἡ πλάρᾳ τὴν πλάραν μετρή, καὶ ὁ κύβον \odot τὸν κύβον μετρήσῃ.

Πρότασις ις. Θεώρημα.

Εὰν τετράγωνον \odot ἀριθμὸς, τετράγωνον ἀριθμὸν μὴ μετρή, ἐδ' ἡ πλάρᾳ τὴν πλάραν

bum triplicatam rationem habet quam latus ad latus.

Propositio 13. Theorema.

Si fuerint quotcunq; numeri continue proportionales, & quisq; eorum seipsum multiplicet, producatq; aliquem numerum, tum producti ex ipsis proportionales erunt. & si illi qui ab initio positi fuerant, multiplicantes eos, qui iam sunt producti, aliosq; producant: etiam illi proportionales erunt: idq; semper in extremis fit numeris.

Propositio 14. Theorema.

Si quadratus numerus numerum quadratum metitur: tum etiam latus metietur alterum latus: & si latus metitur alterum latus: etiam quadratus quadratum metietur.

Propositio 15. Theorema.

Si numerus cubus numerum cubum metitur, etiam latus metietur alterum latus: & si latus, alterum metitur latus: etiam cubus cubum metietur.

Propositio 16. Theorema.

Si quadratus numerus numerum quadratum non metitur: neq; latus alterum latus

ρὰν μετρήσθαι: καὶ ἢ πλάρὰ τὴν πλάρην μὴ μετρήσθαι, ἐδ' ὁ πετράγων Θ τὸ πετράγωνον μετρήσθαι.

Πρότασις ιζ. Θεώρημα.

Εὰν κύβος Θ ἀριθμὸς κύβου ἀριθμὸν μὴ μετρήσθαι, ἐδ' ἢ πλάρὰ τὴν πλάρην μετρήσθαι: καὶ ἢ πλάρὰ τὴν πλάρην μὴ μετρήσθαι ἐδ' ὁ κύβος Θ τὸν κύβον μετρήσθαι.

Πρότασις ιη. Θεώρημα.

Δύο ὁμοίων ἑπιπέδων ἀριθμῶν, εἰς μέσος ἀνάλογος ἐστὶν ἀριθμὸς, καὶ ὁ ἑπίπεδος Θ πρὸς τὸν ἑπίπεδον διπλασίουνα λόγον ἔχει, ἢ ὡς ἢ ὁμόλογος Θ πλάρὰ, πρὸς τὴν ὁμόλογον πλάρην.

Πρότασις ιθ. Θεώρημα.

Δύο ὁμοίων στερεῶν ἀριθμῶν δύο μέσοι ἀνάλογον ἐμπίπτουσιν ἀριθμοὶ, καὶ ὁ στερεὸς πρὸς τὸν ὁμοιον στερεὸν τριπλασίουνα λόγον ἔχει, ἢ ὡς ἢ ὁμόλογος Θ πλάρὰ, πρὸς τὴν ὁμόλογον πλάρην.

Πρότασις κ. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμῶν εἰς μέσοι Θ ἀνάλογον ἐμπίπτει ἀριθμὸς: ὅμοιοι, ἑπιπέδοι ἐσὺνται ἀριθμοὶ.

metietur: & si latus alterum latus non metietur: neq; quadratus quadratum metietur.

Propositio 17. Theorema.

Si cubus numerus, numerum cubum non metitur: neq; latus metietur alterum latus: et si latus alterum latus non metitur: neq; cubus metietur cubum.

Propositio 18. Theorema.

Duobus numeris planis similibus vnus est medius proportionibus, & numerus planus ad numerum planum rationem habet duplicatam quam habet latus homologon, ad latus homologon.

Propositio 19. Theorema.

Duobus numeris solidis similibus duo medij sunt interpositi proportionales numeri: et numerus solidus ad similem solidum numerũ triplicatam habet rationem, quam latus homologon, ad latus homologon.

Propositio 20. Theorema.

Si inter duos numeros vnus medius intercidit proportionalis numerus: illi numeri similes plani erunt.

Prope-

Πρότασις κα. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμῶν, δύο μέσοι ἀνάλογον ἐμπίπῳσιν ἀριθμοὶ, ὁμοίοι στερεοὶ ἔσονται οἱ ἀριθμοὶ.

Πρότασις κβ. Θεώρημα.

Εὰν τρεῖς ἀριθμοὶ ἐξῆς ἀνάλογον ᾶσιν, ὁ δὲ πρῶτ^{ος} τετράγων^{ος} ἢ καὶ ὁ τρίτ^{ος} τετράγων^{ος} ἔσται.

Πρότασις κγ. Θεώρημα.

Εὰν τέσσαρες ἀριθμοὶ ἐξῆς ἀνάλογον ᾶσιν, ὁ δὲ πρῶτ^{ος} κύβος ἢ, καὶ τέταρτ^{ος} κύβος ἔσται.

Πρότασις κδ. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμοὶ πρὸς ἀλλήλους λόγον ἔχωσιν, ὃν τετράγων^{ος} ἀριθμὸς, πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν, ὁ δὲ πρῶτ^{ος} τετράγωνος ἢ, καὶ ὁ δεύτερ^{ος} τετράγων^{ος} ἔσται.

Πρότασις κε. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμοὶ πρὸς ἀλλήλους λόγον ἔχωσιν, ὃν κύβος ἀριθμὸς, πρὸς κύβον ἀριθμὸν, ὁ δὲ πρῶτος κύβ^{ος} ἢ, καὶ ὁ δεύτερ^{ος} κύβ^{ος} ἔσται.

Πρό-

Propositio 21. Theorema.

Si inter duos numeros duo medij proportionales numeri interciderint: illi numeri similes solidi erunt.

Propositio 22. Theorema.

Si tres numeri continue proportionales fuerint, & primus eorum sit quadratus, etiã tertius quadratus erit.

Propositio 23. Theorema.

Si quatuor numeri continue proportionales fuerint, & primus eorum sit cubus: etiã quartus cubus erit.

Propositio 24. Theorema.

Si duo numeri proportionem inter se habeant, quam quadratus ad quadratum, & primus eorum sit quadratus, etiã secundus quadratus erit.

Propositio 25. Theorema.

Si duo numeri proportionem inter se habeant, quam numerus cubus ad numerum cubum: primus verò sit cubus: etiã secundus cubus erit.

Pro-

Πρότασις κς Θεώρημα.

Οι ὅμοιοι ἐπίπεδοι ῥιθμοὶ πρὸς ἀλλή-
 λας λόγον ἔχουσιν, ὃν τετράγων \odot ῥιθμὸς
 πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν.

Πρότασις κζ. Θεώρημα.

Οι ὅμοιοι στερεοὶ ῥιθμοὶ πρὸς ἀλλήλους
 λόγον ἔχουσιν ὃν κύβ \odot ἀριθμὸς πρὸς κύβον
 ἀριθμὸν.

Τέλ \odot τῶν ὀγδὼς σιχταί.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΝΝΑΤΟΝ.

Ε Πρότασις α. Θεώρημα.
 Αν δύο ὅμοιοι ἐπίπεδοι ἀριθμοὶ πολλα-
 πλάσιασάντες ἀλλήλους, ποιῶσι τινὰ, ὁ γνό-
 μμ \odot τετράγων \odot ἔσται.

Πρότασις β. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμοὶ πολλαπλάσιασάντες ἀλ-
 λήλους ποιῶσι τετράγωνον, ὅμοιοι ἐπίπεδοι
 εἶσι.

Πρότασις γ. Θεώρημα.

Εὰν κύβ \odot ἀριθμὸς ἐαυτὸν πολλαπλα-
 σιάσας

Propositio 26. Theorema.

Numeri similes plani inter se proportionem habent, quam quadratus ad quadratum.

Propositio 27. Theorema.

Numeri similes solidi proportionem inter se habent: quam cubus ad cubum.

Finis Libri Octavi.

EVCLIDIS ELEMENT.
LIBER NONVS.

S *Propositio 1. Theorema.*
Si duo numeri similes plani sese mutuo multiplicauerint ac producant aliquem numerum: is numerus erit quadratus.

Propositio 2. Theorema.

Si duo numeri sese mutuo multiplicantes, producant numerum quadratum: erunt illi duo numeri similes plani.

Propositio 3. Theorema.

Si numerus cubus seipsum multiplicauerit,

G rit,

σιάσας ποιῆ τινὰ ὁ γρόμμ $\textcircled{\ominus}$ κύβ $\textcircled{\ominus}$ ἔσται.

Πρότασις δ. Θεώρημα.

Εὰν κύβ $\textcircled{\ominus}$ ἀριθμὸς, κύβον ἀριθμὸν πολλαπλασιάσας ποιῆ τινὰ, ὁ γρόμμ $\textcircled{\ominus}$ κύβος ἔσται.

Πρότασις ε. Θεώρημα.

Εὰν κύβ $\textcircled{\ominus}$ ἀριθμὸς, ἀριθμὸν τινὰ πολλαπλασιάσας κύβον ποιῆ, καὶ ὁ πολλαπλασιασθεὶς κύβ $\textcircled{\ominus}$ ἔσται.

Πρότασις ς. Θεώρημα,

Εὰν ἀριθμὸς ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας κύβον ποιῆ, καὶ αὐτὸς κύβ $\textcircled{\ominus}$ ἔσται.

Πρότασις ζ. Θεώρημα.

Εὰν σιώθητ $\textcircled{\ominus}$ ἀριθμὸς, ἀριθμὸν τινὰ πολλαπλασιάσας ποιῆ τινὰ, ὁ γρόμμος σερεὸς ἔσται.

Πρότασις η. Θεώρημα.

Εὰν ἀπὸ μονάδ $\textcircled{\ominus}$ ὅποσιῶν ἀριθμοὶ ἐξῆς ἀνάλογον ὦσιν, ὁ μὲν τρίτ $\textcircled{\ominus}$ ἀπὸ τῆς μονάδ $\textcircled{\ominus}$ τετράγων $\textcircled{\ominus}$ ἔσιν, καὶ οἱ ἐνά Διφλείπωντες πάντες: ὁ δὲ τέταρτ $\textcircled{\ominus}$ κύβ $\textcircled{\ominus}$: καὶ οἱ δύο Διφλείπωντες πάντες: ὁ δὲ ἑβδομ $\textcircled{\ominus}$ κύβ $\textcircled{\ominus}$ ἅμα καὶ τετράγων $\textcircled{\ominus}$ καὶ οἱ ὡέντε Διφλείπωντες πάντες.

rit, & producat aliquem numerum: is qui producitur erit cubus.

Propositio 4. Theorema.

Si cubus numerus, numerum cubum multiplicauerit, & produxerit aliquem, tum numerus productus erit cubus.

Propositio 5. Theorema.

Si numerus cubus, numerum aliquem multiplicet: & producat cubum: & numerus multiplicatus erit cubus.

Propositio 6. Theorema.

Si numerus aliquis seipsum multiplicet ac producat cubum etiam ipsemet cubus erit.

Propositio 7. Theorema.

Si numerus compositus, numerum aliquem multiplicauerit & producat aliquem: numerus productus solidus erit.

Propositio 8. Theorema.

Si ab vnitare aliquot numeri cōtinuè proportionales fuerint, & tertius ab vnitare sit quadratus, etiam vno intermisso omnes: quartus verò cubus & duobus intermissis omnes, septimus verò etiam est cubus, & quadratus, & quinque intermissis omnes.

Πρότασις θ. Γεώρημα.

Εάν ἀπὸ μονάδ \odot ὀποσσιουῶν ἀριθμοὶ ἐξῆς ἀνάλογον ὦσιν, ὁ δὲ μετὰ τὴν μονάδα τετράγων \odot ἢ, καὶ οἱ λοιποὶ πάντες τετράγωνοι ἔσονται: καὶ ἐὰν ὁ μετὰ τὴν μονάδα κύβ \odot ἢ, ἔσονται οἱ λοιποὶ πάντες κύβοι ἔσονται.

Πρότασις ι. Θεώρημα.

Εάν ἀπὸ μονάδ \odot ὀποσσιουῶν ἀριθμοὶ ἀνάλογον ὦσιν, ὁ δὲ μετὰ τὴν μονάδα μὴ ἢ τετράγωνος, ἢ δ' ἄλλ \odot ἢ δὲ τετράγων \odot ἔσται, χωρὶς τῶν τρίτων ἀπὸ τῆς μονάδ \odot , καὶ τῶν ἑνα διασφύροντων πάντων: καὶ ἐὰν ὁ μετὰ τὴν μονάδα κύβ \odot μὴ ἢ, ἢ δ' ἄλλ \odot ἢ δὲ κύβ \odot ἔσται, χωρὶς τῶν τετάρτων ἀπὸ τῆς μονάδ \odot , καὶ τῶν δύο διασφύροντων πάντων.

Πρότασις ια. Γεώρημα.

Εάν ἀπὸ μονάδ \odot ὀποσσιῶν ἀριθμοὶ ἐξῆς ἀνάλογον ὦσιν, ὁ ἐλάττων ἢ μείζονα μετρεῖ, κατὰ πινὰ τῶν ὑπαρχόντων ἐν τοῖς ἀνάλογον ἀριθμοῖς.

Πρότασις ιβ. Γεώρημα.

Εάν ἀπὸ μονάδ \odot ὀποσσιῶν ἀριθμοὶ ἀνάλο-

Propositio 9. Theorema.

Si ab unitate aliquot numeri continue proportionales fuerint: Is verò qui post unitatem sequitur fuerit quadratus: etiam reliqui omnes quadrati erunt: & si is qui unitatem sequitur fuerit cubus: etiam reliqui omnes erunt cubi.

Propositio 10. Theorema.

Si ab unitate aliquot numeri proportionales fuerint: is verò qui unitatem sequitur non fuerit quadratus: neq; quispiam insequentium quadratus erit, exceptis tertio ab unitate & vnum intermittentibus omnibus: & si qui unitatem sequitur non fuerit cubus: neque alius quispiam cubus erit, exceptis quarto ab unitate & duo intermissis omnibus.

Propositio 11. Theorema.

Si ab unitate aliquot numeri continue fuerint proportionales minor maiorem metietur per numeros, qui inter illos numeros proportionales fuerit.

Propositio 12. Theorema.

Si ab unitate aliquot numeri proportionales

G 3 nales

ἀνάλογον ὦσιν: ὑφ' ὅσων ἀν' ὁ ἕκαστος πρῶτων ἀριθμῶν μετρεῖται, ὑπὸ τῶν αὐτῶν, καὶ ὁ παρὰ τὴν μονάδα μετρηθήσεται.

Πρότασις ιγ. Θεώρημα.

Εὰν ἀπὸ μονάδος ὅποσοιῦν ἀριθμοὶ ἐξῆς ἀνάλογον ὦσιν: ὁ δὲ μετὰ τὴν μονάδα πρῶτος ἢ ὁ μέγιστος ὑπὸ ἑδενός ἄλλος μετρηθήσεται πάρεξ τῶν ὑπαρχόντων ἐν τοῖς ἀνάλογον ἀριθμοῖς.

Πρότασις ιδ. Θεώρημα.

Εὰν ἐλάχιστος ἀριθμὸς ὑπὸ πρῶτων ἀριθμῶν μετρηῆται, ὑπὸ ἑδενός ἄλλος ἀριθμὸς μετρηθήσεται πάρεξ τῶν ἐξ ἀρχῆς μετροῦντων.

Πρότασις ιε. Θεώρημα.

Εὰν τρεῖς ἀριθμοὶ ἐξῆς ἀνάλογον ὦσιν, ἐλάχιστοι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐχόντων αὐτοῖς, δύο ὅποιοι σφιθέντες, πρὸς τὸν λοιπὸν πρῶτοι εἰσιν.

Πρότασις ις. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ὦσιν, ἕκαστος ὡς ὁ πρῶτος πρὸς τὸν δεύτερον: οὕτως ὁ δεύτερος πρὸς ἄλλον πᾶσι.

Πρότα-

nales fuerint: quot extremum numerum, numeri primi metiuntur: ijdem etiam eum qui unitatem sequitur metientur.

Propositio 13. Theorema.

Si ab unitate aliquot numeri continue proportionales fuerint: is verò qui unitatem sequitur fuerit primus: tum maximum numerum nullus alius numerus metietur quam qui ex numeris fuerint cum ipso proportionalibus

Propositio 14. Theorema.

Si minimum numerum primi numeri metiuntur: tum nullus alius eum metietur, præterquam qui ab initio eum metiebantur.

Propositio 15. Theorema.

Si tres numeri continuè proportionales fuerint: minimi eorum qui eandem cum eis habent proportionem duo quicunq; sunt compositi ad reliquum primi erunt.

Propositio 16. Theorema.

Si duo numeri primi inter se fuerint: non erit proportio vt primus ad secundum, ita secundus ad aliquem alium.

Πρότασις ιζ. Θεώρημα.

Εὰν ὦσιν ὅσοιδηποιοῦν ἀριθμοὶ ἐξῆς ἀνάλογον: οἱ δὲ ἄκροι αὐτῶν πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ὦσιν: ὅσκι ἔσται ὡς ὁ πρῶτος \odot πρὸς τὸν δεύτερον: ἔτι ὡς ὁ ἕνατος \odot πρὸς ἄλλόν τινα.

Πρότασις ιη. πρόβλημα.

Δύο ἀριθμῶν δοθέντων, ἴπιοκέψασθαι εἰ δυνατὸν ἐστὶν αὐτοῖς τρίτον ἀνάλογον προσδεῖν.

Πρότασις ιθ. Πρόβλημα.

Τριῶν ἀριθμῶν δοθέντων, ἴπιοκέψασθαι εἰ δυνατὸν ἐστὶν αὐτοῖς τέταρτον ἀνάλογον προσδεῖν.

Πρότασις κ. Θεώρημα.

Οἱ πρῶτοι ἀριθμοὶ πλείους εἰσὶ, παντὸς τῆς προτεθέντος πλείους πρώτων ἀριθμῶν.

Πρότασις κἀ. Θεώρημα.

Εσάν ἄρτιοι ἀριθμοὶ ὅποσοιῶν σωτεθῶσιν, ὁ ὅλος \odot ἄρτιος \odot ἐστί.

Πρότασις κβ. Θεώρημα.

Εὰν περισοὶ ἀριθμοὶ ὅποσοιοῦν σωτεθῶσιν: τὸ δὲ πλῆθος \odot αὐτῶν ἄρτιον ἢ, ὁ ὅλος \odot ἄρτιος \odot ἔσται.

Πρότα-

Propositio 17. Theorema.

Si fuerint aliquot numeri continue proportionales, & illorum extremi sint inter se primi: non erit ut primus ad secundum; ita extremus ad aliquem alium.

Propositio 18. Problema.

Duobus propositis numeris contemplari an tertius proportionalis inueniri possit.

Propositio 19. Problema.

Tribus datis numeris contemplari an quartus proportionalis inueniri possit.

Propositio 20. Theorema.

Plures sunt numeri primi: quàm quæuis primorum numerorum multitudo proposita.

Propositio 21. Theorema.

Si numeri pares quotquot illorū sint componantur: tum totus numerus erit par.

Propositio 22. Theorema.

Si numeri impares quotcunq; illorum fuerint componantur, & par illorum fuerit multitudo: tum totus numerus par erit.

Πρότασις κγ. Θεώρημα.

Εὰν περὶ ἑὸς ἀριθμοῦ ὀποσοῖν στυτεθῶ-
σιν: τὸ δὲ πλῆθος αὐτῶν περὶ τὸν ἦ, καὶ ὅ-
λον περὶ τὸν ἔσται.

Πρότασις κδ. Θεώρημα.

Εὰν ἀπὸ ἀρτίου ἀριθμοῦ ἄρτιον ἀφαι-
ρεθῆ, καὶ ὁ λοιπὸς ἄρτιον ἔσται.

Πρότασις κε. Θεώρημα.

Εὰν ἀπὸ ἀρτίου ἀριθμοῦ, περὶ τὸν ἄφαι-
ρεθῆ, καὶ ὁ λοιπὸς περὶ τὸν ἔσται.

Πρότασις κς. Θεώρημα.

Εὰν ἀπὸ περὶ ἑὸς ἀριθμοῦ περὶ τὸν ἄ-
φαιρεθῆ καὶ ὁ λοιπὸς ἄρτιον ἔσται.

Πρότασις κζ. Θεώρημα.

Εὰν ἀπὸ πλείου ἀριθμοῦ ἄρτιος ἀφαιρε-
θῆ, ὁ λοιπὸς περὶ τὸν ἔσται.

Πρότασις κη. Θεώρημα.

Εὰν περὶ τὸν ἀριθμὸς ἄρτιον πολλαπλα-
σιάσας ποιῆ τινὰ, ὁ γενόμενος ἄρτιον ἔσται.

Πρότασις κθ. Θεώρημα.

Εὰν περὶ τὸν ἀριθμὸς περὶ τὸν ἀριθ-
μὸν πολλαπλασιάσας ποιῆ τινὰ, ὁ γινόμενος
περὶ τὸν ἔσται.

πρότα-

Propositio 23. Theorema.

*Si aliquot numeri impares componantur,
& illorum multitudo fuerit impar: totus eti-
am numerus impar erit.*

Propositio 24. Theorema.

*Si à numero pari auferatur numerus par,
etiam reliquus numerus par erit.*

Propositio 25. Theorema.

*Si à numero pari, numerus impar aufera-
tur: etiam reliquus impar erit.*

Propositio 26. Theorema.

*Si à numero impari auferatur numerus
impar: etiam reliquus par erit.*

Propositio 27. Theorema.

*Si à numero impari auferatur numerus
par: etiam reliquus numerus impar erit.*

Propositio 28. Theorema.

*Si numerus impar numerum parem mul-
tiplicauerit: ac fecerit aliquem, is qui fit nu-
merus, par erit.*

Propositio 29. Theorema.

*Si numerus impar numerum imparem
multiplicauerit ac produxerit aliquem: is qui
producitur est impar.*

πρότασις λ. θεώρημα.

Εὰν περισὸς ἀριθμὸς ἄρτιον ἀριθμὸν μετρήῃ, καὶ τὸν ἡμισυ αὐτῆ μετρήσῃ.

πρότασις λα. θεώρημα.

Εὰν περισὸς ἀριθμὸς πρὸς τινὰ ἀριθμὸν πρῶτον ἢ, καὶ πρὸς τὸν διπλασίον αὐτῆ πρῶτον ἔσται,

πρότασις λβ. θεώρημα.

Τῶν ἀπὸ δυάδων διπλασιαζομένων ἀριθμῶν ἀρτιάκις ἄρτιον ἔστι μόνον.

πρότασις λγ. θεώρημα.

Εὰν ἀριθμὸς τὸν ἡμισυ ἔχη περισὸν, ἀρτιάκις περισὸς ἔστι μόνον.

πρότασις λδ. θεώρημα.

Εὰν ἄρτιος ἀριθμὸς μήτε τῶν ἀπὸ δυάδων διπλασιαζομένων ἢ, μήτε τὸν ἡμισυ ἔχη περισὸν: ἀρτιάκις τε ἄρτιον ἔστι: καὶ ἀρτιάκις περίωτον.

πρότασις λε. θεώρημα.

Εὰν ὡσιν ὁσιδηποιοῦν ἀριθμοὶ ἐξῆς ἀνάλογον, ἀφαιρεθῶσι δὲ ἀπὸ τετῆ δαυτέρου, καὶ ἔσται ἴσος τῷ πρῶτῳ ἔσται ὡς ἢ δαυτέρου ὑπεροχὴ πρὸς τὸν πρῶτον, ἔσται ἢ ἔσται

χάτις

Propositio 30. Theorema.

Si numerus impar numerum parem metitur: etiam dimidium eius metietur.

Propositio 31. Theorema.

Si numerus impar ad aliquem numerum fuerit primus, & ad eius duplum primus erit.

Propositio 32. Theorema.

Numeri qui per binarium numerum duplicantur solum pariter pares sunt.

Propositio 33. Theorema.

Si numerus aliquis dimidium sui habuerit imparem: is erit pariter impar tantum.

Propositio 34. Theorema.

Si numerus par neq; ex ijs erit qui per binarium sunt duplicati: neq; ex ijs qui dimidium sui habent numerum imparem: is erit pariter par: & erit pariter impar.

Propositio 35. Theorema.

Si fuerint aliquot numeri continuè proportionales, & à secundo atq; postremo auferatur numerus, primo æqualis: tum erit ut excessus secundi ad primum, sic excessus postremi

χάτῃ ὑπεροχῇ πρὸς τὰς πρὸ ἑαυτῆς ἀπειρίας.

Πρότασις λς. θεώρημα.

Εὰν ἀπὸ μονάδου ὅποσοιῶν ἀριθμοὶ ἐξῆς ἐκλεθῶσιν, ἐν τῇ διπλασίονι ἀναλογία ἕως οὗ ὁ σύμπασ σιωτεθεὶς πρῶτος γένῃ, καὶ ὁ σύμπασ ὅπῃ τὸν ἕχατον πολλαπλασιασθεὶς ποιῇ τινὰ ὁ γινόμενον τέλει ἔσται.

Τέλει τῶ ἐκνατοῦ στοιχείου.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ.

ΟΡΟΙ.

Σὺμμετρα μεγέθη λέγεται, τὰ τῶ αὐτῶ μέτρῳ μετρεῖσθαι.

Ἀσύμμετρα δὲ, ὧν μηδὲν ἐνδέχεται κοινὸν μέτρον γενέσθαι.

Ευθεῖαι διωάμει σύμμετροι εἰσὶν, ὅταν τὰ ὑπὸ αὐτῶν τετραγῶνα, τῶ αὐτῶ χωρίῳ μετρηθῆται.

Ἀσύμμετροι δὲ, ὅταν τοῖς ὑπὸ αὐτῶν τετραγῶνοις, μηδὲν ἐνδέχεται χωρίον κοινὸν μέτρον γενέσθαι.

Τῶτων

stremi ad omnes qui eum præcedunt.

Propositio 36. Theorema.

Si ab unitate exponantur aliquot numeri continuè proportionales in proportione dupla : donec totus compositus primus fiat : & totus numerus ille in extremum multiplicatus producat aliquem : numerus qui fit erit perfectus.

Finis Libri Noni Elementorum Euclidis.

*EVCLIDIS ELEMENTO-
RVM LIBER X.*

Definitiones.

C*ommensurabiles magnitudines illæ dicuntur esse, quas eadē mensura metitur.*

Incommensurabiles verò illæ magnitudines dicuntur: quarum nullam cōmunem mensuram contingit inuenire.

Lineæ rectæ potentia cōmensurabiles sunt quarum quadrata vna eademq; superficies metitur.

Lineæ verò rectæ incōmensurabiles sunt, quarum quadrata quæ metiatur ea, nulla inueniri potest.

His

Τῶν ὑποκφμένων, δείκνυται ὅτι τῇ
 περιθείσῃ δὴθεῖα ὑπάρχουσιν δὴθεῖαι πλῆ-
 θὲ ἀπειροὶ συμμετροί τε, καὶ ἀσύμμετροι, αἰ-
 μὲν, μήκει καὶ δυνάμει, αἰ δὲ δυνάμει μόνον.

Καλείδω ἔνῃ μὲν περιθεῖσα δὴθεῖα ῥη-
 τή. καὶ αἰ ταύτη συμμετροὶ εἴτε μήκει, καὶ
 δυνάμει, εἴτε δυνάμει μόνον, ῥηταὶ.

Αἰ δὲ ταύτη ἀσύμμετροι ἄλογοι καλεί-
 δωσαν, καὶ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς περιθείσης δὴ-
 θεῖας τετράγωνον, ῥητόν.

Καὶ τὰ τῶν συμμετροῦ ῥητὰ. Τὰ δὲ τῶν
 ἀσύμμετροῦ ἄλογα καλείδω, καὶ αἰ δυ-
 νάμει αὐτὰ, ἄλογοι. Εἰ μὲν τετράγωνον
 εἴη, αὐτὰ αἰ πλάττειν, εἰ δὲ ἕτερα πινὰ δὴ-
 γραμμα, αἰ ἴσῃ αὐτῶν τετράγωνα ἀναγνά-
 φουσα ἄλογον καλείδω.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Πρότασις α. Θεώρημα.

Δ Το μεγεθῶν ἀρίστων ἐκκφμένων, ἐὰν ἀπὸ
 τῶ μείζονος ἀφαιρεθῇ μείζον, ἢ τὸ ἥμι-
 συ, καὶ τῶ καλαφτόμενον, μείζον ἢ τὸ ἥμισυ, καὶ
 τῶ ἄν γίγηται. λειφθήσεται τι μέγεθος, ὅ
 ἐστὶν ἔλαστον ἐκκειμένον ἐλάστονος μεγέθους.

Πρότα-

His sic se habentibus ostenditur quod lineæ rectæ datæ, existant aliæ lineæ rectæ innumerabiles partim cōmensurabiles, partim incommensurabiles, aliæ quidem longitudine et potentia, aliæ verò potentia tantum.

Vocetur igitur lineæ rectæ datæ, ῥητὴ, rationalis: quæ verò huic lineæ sunt commensurabiles, siue longitudine & potentia, siue potentia tantum: & ipsæ vocentur rationales.

Quæ autem huic lineæ rectæ incommensurabiles sunt, nominentur irrationales.

Quadratum etiam quod à lineæ proposita rationali describitur, appelletur rationale. Quæ etiam huic sunt commensurabilia nominentur rationalia. Quæ verò ei sunt incommensurabilia nominentur irrationalia aut surda. Lineæ deniq; quæ illa describunt irrationales dicantur, si sit quadratum ipsa latera sunt irrationalia, si verò aliæ figuræ rectilineæ tum lineæ quæ describunt quadrata figuris rectilineis æqualia vocentur irrationales.

Propositio 1. Theorema.

D*uabus magnitudinibus inæqualibus propositis, si de maiori detrahatur plus dimidio: & rursus de reliquo iterum detrahatur plus dimidio, idq; semper fiat: relinquetur quædam magnitudo minor altera minore ex duabus propositis.*

H Proc

Πρότασις β. Θεώρημα.

Εὰν δύο μεγεθῶν ἐκκλιμένων ἀνίσων ἀντιφαιρμένον αἰεὶ τῷ ἐλάσσονι ὁ ἀπὸ τοῦ μείζονος, τὸ κατὰ τὸν ὁμοῦ μὴδέποτε καταμετρητὸν τὸ πρὸς ἑαυτῷ, ἀσύμμετρα ἔσται τὰ μεγέθη.

Πρότασις γ. πρόβλημα.

Δύο μεγεθῶν συμμέτρων δοθέντων, τὸ μείζον αὐτῶν κοινὸν μέτρον εἶρεῖν.

Πρότασις δ. πρόβλημα.

Τριῶν μεγεθῶν συμμέτρων δοθέντων, τὸ μείζον αὐτῶν κοινὸν μέτρον εἶρεῖν.

Πρότασις ε. Θεώρημα.

Τὰ σύμμετρα μεγέθη πρὸς ἀλλήλα λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν.

Πρότασις ς. Θεώρημα.

Εὰν δύο μεγέθη πρὸς ἀλλήλα, λόγον ἔχη ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, σύμμετρα ἔσται τὰ μεγέθη.

Πρότασις ζ. Θεώρημα.

Τὰ ἀσύμμετρα μεγέθη πρὸς ἀλλήλα, λόγον οὐκ ἔχει ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν.

Πρό-

Propositio 2. Theorema.

Duabus magnitudinibus propositis inæqualibus, si detrahatur semper minor de maiore, neq; residuum vnquam metiatur id quod ante se metiebatur: incommensurabiles erunt illæ magnitudines.

Propositio 3. problema.

Datis duabus magnitudinibus commensurabilibus maximam eorum cõmunem mensuram inuenire.

Propositio 4. problema.

Datis tribus magnitudinibus commensurabilibus, maximam earum communem mensuram inuenire.

Propositio 5. Theorema.

Magnitudines commensurabiles eam inter se habent proportionem, quam numerus ad numerum.

Propositio 6. Theorema.

Si duæ magnitudines eam habeant proportionem quam numerus ad numerum: illæ sunt cõmensurabiles.

Propositio 7. Theorema.

Magnitudines incõmensurabiles eam non habent inter se proportionem quam numerus ad numerum.

Πρότασις η. θεώρημα.

Εὰν δύο μεγέθη πρὸς ἄλληλα λόγον μὴ ἔχη ὄν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν, ἀσύμμετρα ἔσται τὰ μεγέθη.

Πρότασις θ. θεώρημα.

Τὰ ἀπὸ τῶν μήκῃ συμμετρῶν ὄντων τετράγωνα, πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχει ὄν τετράγωνος ἀριθμὸς, πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν, καὶ τὰ τετράγωνα, τὰ πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχοντα, ὄν τετράγωνον ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν, καὶ τὰς πλευρὰς ἔξει μήκῃ συμμετρῆς, τὰ δὲ ἀπὸ τῶν μήκῃ ἀσύμμετρῶν ὄντων τετράγωνα πρὸς ἄλληλα, λόγον οὐκ ἔχει ὄντες τετράγωνον ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν. καὶ τὰ τετράγωνα τὰ πρὸς ἄλληλα λόγον μὴ ἔχοντα ὄντες τετράγωνον ἀριθμὸς, πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν, ἔδὲ τὰς πλευρὰς ἔξει μήκει ἀσύμμετρους.

Πόρισμα.

Καὶ φανερὸν ἔστω ὅτι τῶν δεδειγμένων ὅτι αἱ μήκει ἀσύμμετροι πάντως καὶ διωάμει. αἱ δὲ διωάμει ἀσύμμετροι, ἔ πάντως καὶ μήκει, καὶ

Propositio 8. Theorema.

Si duæ magnitudines non habuerint eam proportionem, quam numerus ad numerum, incommensurabiles illæ erunt.

Propositio 9. Theorema.

Quadrata quæ describuntur à rectis lineis longitudine commensurabilibus, inter se proportionem habent quam numerus quadratus ad numerum quadratum. Et quadrata habentia proportionem inter se quam quadratus numerus ad quadratum numerum, habebunt etiam latera longitudine commensurabilia. Quadrata verò quæ describuntur à lineis rectis longitudine incommensurabilibus proportionem non habent inter se quam quadratus numerus ad numerum quadratum: & quadrata non habentia proportionem inter se quæ quadratus numerus ad quadratū neq; latera habebunt longitudine cōmensurabilia.

Corollarium.

Ex iam demonstratis manifestum est lineas longitudine commensurabiles, omnino potentia quoq; esse cōmensurabiles. Quæ verò

κει, καὶ αἱ μήκει ἀσύμμετροι, ἔ πάντως καὶ δυνάμει ἀσύμμετροι, αἱ δὲ δυνάμει ἀσύμμετροι, πάντως καὶ μήκει.

Πρότασις ι. Θεώρημα.

Ἐὰν τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον ᾗ, τὸ δὲ πρῶτον τῷ δευτέρῳ σύμμετρον ᾗ, καὶ τὸ τρίτον τῷ τετάρτῳ σύμμετρον ἔσται. καὶ τὸ πρῶτον τῷ δευτέρῳ ἀσύμμετρον ᾗ, καὶ τὸ τρίτον τῷ τετάρτῳ ἀσύμμετρον ἔσται.

Πρότασις ια. πρόβλημα.

Τῇ προτεθείσῃ ὁθεῖα προσδρεῖν δύο ἐνθείας ἀσυμμέτρους πῶ μὲν μήκει μόνον πῶ δὲ καὶ δυνάμει.

Πρότασις ιβ. Θεώρημα.

Τὰ τῶν αὐτῶν μεγέθη σύμμετρα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶ σύμμετρα.

Πρότασις ιγ. Θεώρημα.

Ἐὰν ᾗ δύο μεγέθη, καὶ τὸ μὲν σύμμετρον ᾗ τῶν αὐτῶν τὸ δὲ ἕτερον ἀσύμμετρον, ἀσύμμετρα ἔσται τὰ μεγέθη.

Πρότασις ιδ. Θεώρημα.

Ἐὰν

rentia sunt commensurabiles non omnino longitudine quoque commensurabiles sunt: & quae longitudine incommensurabiles sunt, non omnino potentia etiam incommensurabiles esse: quae verò potentia incommensurabiles sunt omnino etiam longitudine quoque incommensurabiles esse.

Propositio 10. Theorema.

Si quatuor magnitudines fuerint proportionales, prima verò secunda fuerit commensurabilis, tertia quoque quarta commensurabilis erit. Quod si prima secunda fuerit incommensurabilis, tertia quoque quarta erit incommensurabilis.

Propositio 11. problema.

Proposita linea recta (quae nominata est ἐπί) invenire duas lineas rectas incommensurabiles, hanc quidem longitudine tantum, illam verò non longitudine tantum, sed etiam potentia incommensurabilem.

Propositio 12. Theorema.

Magnitudines quae eidem magnitudini sunt commensurabiles: inter se quoque commensurabiles sunt.

Propositio 13. Theorema.

Si fuerint duae magnitudines, & altera eidem sit commensurabilis, altera verò incommensurabilis, illae magnitudines incommensurabiles erunt:

Propositio 14. Theorema.

Εὰν ἢ δύο μεγέθη σύμμετρα, τὸ δὲ ἕτερον αὐτῶν μεγέθη πινὶ ἀσύμμετρον ἢ, καὶ τὸ λοιπὸν τῶ αὐτῶ ἀσύμμετρον ἔσται.

Πρότασις ιε. Θεώρημα.

Εὰν τέσσαρες ἀθεῖαι ἀνάλογον ὦσιν, δύνηται δὲ ἡ πρώτη τῆς δευτέρας μείζον, τῶ ἀπὸ συμμέτρων ἑαυτῇ μήκει, καὶ ἡ τρίτη τῆς τετάρτης μείζον διωθήσεται, τῶ ἀπὸ συμμέτρων ἑαυτῇ μήκει, καὶ εἰ ἡ πρώτη τῆς δευτέρας μείζον διωθήσεται, τῶ ἀπὸ ἀσυμμέτρων ἑαυτῇ μήκει, καὶ ἡ τρίτη τῆς τετάρτης μείζον διωθήσεται τῶ ἀπὸ ἀσυμμέτρων ἑαυτῇ μήκει.

Πρότασις ις. Θεώρημα.

Εὰν δύο μεγέθη σύμμετρα σωτηθῇ, καὶ τὸ ὅλον ἑκατέρω αὐτῶν, σύμμετρον ἔσται, καὶ τὸ ὅλον ἐνὶ αὐτῶν σύμμετρον ἢ, καὶ τὰ ἐξ ἀρχῆς μεγέθη σύμμετρα ἔσται.

Πρότασις ιζ. Θεώρημα.

Εὰν δύο μεγέθη ἀσύμμετρα σωληθῇ, καὶ τὸ ὅλον ἑκατέρω αὐτῶν ἀσύμμετρον ἔσται. καὶ τὸ ὅλον ἐνὶ αὐτῶ ἀσύμμετρον ἢ, καὶ τὰ ἐξ ἀρχῆς μεγέθη ἀσύμμετρα ἔσται.

Πρότα-

Si fuerint duæ magnitudines commensurabiles, & altera illarum alteri cuiuspiam magnitudini sit incommensurabilis, etiam reliqua magnitudo eidem incommensurabilis erit.

Propositio 15. Theorema.

Si quatuor lineæ rectæ proportionales fuerint, pos sit autem prima plusquam secunda tanto quantum est quadratum lineæ sibi commensurabilis longitudine: tertia plus poterit quam quarta tanto quantum est quadratum lineæ sibi commensurabilis longitudine, & si prima plus potest quam secunda tanto quantum est quadratum lineæ sibi incommensurabilis longi tudine etiam tertia plus potest quam quarta tanto quantum est quadratum lineæ sibi incommensurabi lis longitudine.

Propositio 16. Theorema.

Si duæ magnitudines commensurabiles componan tur, tota magnitudo composita singulis partibus com mensurabilis erit. Quod si tota magnitudo composita, alterutri parti commensurabilis fuerit: illæ duæ partes commensurabiles erunt.

Propositio 17. Theorema.

Si duæ magnitudines incommensurabiles compo nantur, ipsa tota magnitudo singulis partibus com ponentibus incommensurabilis erit. Quod si tota al teri parti fuerit incommensurabilis, illæ quoque primæ magnitudines inter se incommensurabiles erunt.

H v Propo-

Πρότασις ιη. Θεώρημα.

Εὰν ὡσι δύο ὀρθαῖαι ἄνισοι, τῶ δὲ τετάρτῳ μέρει τῶ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ἴσον παραλληλόγραμμον παρὰ τὴν μείζονα παραβληθῆ ἑλλείπον εἶδος τετραγώνῳ καὶ εἰς σύμμετρα αὐτῷ διαιρεῖ μήκει, ἢ μείζων τῆς ἐλάσσονος μείζον διωθήσεται, τῶ ἀπὸ συμμέτρων ἑαυτῆς μήκει. καὶ εἰ ἢ μείζων τῆς ἐλάσσονος μείζον διωθήσεται τῶ ἀπὸ συμμέτρων ἑαυτῆς μήκει, τῶ δὲ τετάρτῳ μέρει τῶ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ἴσον παραλληλόγραμμον παρὰ τὴν μείζονα παραβληθῆ ἑλλείπον εἶδος τετραγώνῳ, εἰς σύμμετρα αὐτῷ διαιρεῖ μήκει.

Πρότασις ιθ. Θεώρημα.

Εὰν ὡσι δύο ὀρθαῖαι ἄνισοι, τῶ δὲ τετάρτῳ μέρει τῶ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ἴσον παρὰ τὴν μείζονα παραβληθῆ, ἑλλείπον εἶδος τετραγώνῳ, καὶ εἰς ἀσύμμετρα αὐτῷ διαιρῆ μήκει, ἢ μείζων τῆς ἐλάσσονος, μείζον διωθήσεται, τῶ ἀπὸ ἀσύμμέτρων ἑαυτῆς, καὶ εἰ ἢ μείζων τῆς ἐλάσσονος μείζον διωθήσεται, τῶ ἀπὸ ἀσύμμέτρων ἑαυτῆς, τῶ δὲ τετάρτῳ ἔτι ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος, ἴσον παρὰ τὴν μείζονα παραβληθῆ

Propositio 18. Theorema.

Si fuerint duæ rectæ lineæ inæquales, & quartæ parti quadrati quod describitur à minore æquale parallelogrammum applicetur secundum maiorem, ex qua maiore tantum excurrat extra latus parallelogrammi, quantum est alterum latus ipsius parallelogrammi. Si præterea parallelogrammum sui applicatione diuidat lineam illam in partes inter se commensurabiles longitudine: illa maior lineæ tanto plus potest quàm minor, quantum est quadratum lineæ sibi commensurabilis longitudine. Quod si maior plus possit quàm minor, tanto quantum est quadratum lineæ sibi commensurabilis longitudine: & præterea quartæ parti quadrati lineæ minoris æquale parallelogrammum applicetur secundum maiorem, ex qua maiore tantum excurrat extra latus parallelogrammi, quantum est alterum latus ipsius parallelogrammi parallelogrammum sui applicatione diuidit maiorem in partes inter se longitudine commensurabiles.

Propositio 19. Theorema.

Si fuerint duæ lineæ rectæ inæquales, quartæ autem parti quadrati lineæ minoris æquale parallelogrammum secundum lineam maiorem applicetur, ex qua lineæ tantum excurrat extra latus parallelogrammi, quantum est alterum latus eiusdem parallelogrammi: si parallelogrammum præterea sui applicatione diuidat lineam in partes se longitudine incommensurabiles, maior illa lineæ tanto plus potest quàm minor: quantum est quadratum lineæ sibi maiori incommensurabilis longitudine.

βληθῆ ἑλλείπον εἶδει τετραγώνω, εἰς ἀσύμμετρα αὐτῷ διαιρεῖ μήκη.

Πρότασις κ. Θεώρημα.

Τὸ ὑπὸ ρητῶν μήκη συμμετρῶν κατὰ πνα τῶν προειρημένων τρόπων ὄθειων περιεχόμενον ὀρθογώνιον, ρητόν ἐστι.

Πρότασις κα. Θεώρημα.

Ἐὰν ρητὴν παρὰ ρητῷ παραβληθῆ, πλάτῃ ποιῆ ρητῷ καὶ σύμμετρον, τῇ παρ' ἡὺ παράκρηται μήκει.

Πρότασις κβ. Θεώρημα.

Τὸ ὑπὸ ρητῶν διωάμῃ μόνον συμμετρῶν ὄθειων, περιεχόμενον ὀρθογώνιον, ἀλογόν ἐστι, καὶ ἡ διωαμένη αὐτὸ, ἀλογῶν ἐστὶ, καλεῖσθω ἡ μέση.

Λήμμα.

Ἐὰν ὡσι δύο ὄθειαι, ἔστιν ὡς ἡ πρώτη πρὸς τῷ δευτέρῃ, ἔτως τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν δύο ὄθειων.

Πρότασις κγ. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ

commensurabilis longitudine: quod si maior linea tanto plus possit quam minor, quantum est quadratum lineæ commensurabilis sibi longitudine, & præterea quartæ parti quadrati lineæ minoris æquale parallelogrammum applicetur secundum maiorem, ex qua tantum excurrat extra latus parallelogrammi: quantum est alterum latus ipsius: parallelogrammū sui applicatione diuidit maiorem in partes inter se incommensurabiles longitudine.

Propositio 20. Theorema.

Rectangulum quod lineis rectis rationalibus longitudine commensurabilibus secundum vnum aliquem ex prædictis modum continetur rationale est.

Propositio 21. Theorema.

Si rationale secundum lineam rationalem applicetur, habebit alterum latus lineam rationalem & commensurabilem longitudine lineæ cui, rationale parallelogrammon applicatur.

Propositio 22. Theorema.

Rectangulum quod continetur duabus lineis rectis rationalibus potentia tantum commensurabilibus irrationalis est linea autem, quæ illud potest irrationalis & ipsa est vocetur vero medialis.

Lemma.

Si sint duæ lineæ rectæ erit vt prima ad secundā ita quadratum quod à prima describitur ad rectangulum quod duabus illis rectis continetur.

Propositio 23. Theorema.

Quadræ

Τὸ ἀπὸ μέσης παρὰ ῥητῶν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ῥητῶν, καὶ ἀσύμμετρον, τῆ παρ' αὐτῶν παράκλιται μήκη.

Πρότασις κδ. Θεώρημα.

Ἡ τῆ μέση σύμμετρος Θ , μέση ἐστίν.

Πρότασις κε. Θεώρημα.

Τὸ ὑπὸ μέσων μήκει συμμέτρων Δ θειῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον, μέσον ἐστίν.

Πρότασις κς. Θεώρημα.

Τὸ ὑπὸ μέσων διωάμει μόνον συμμέτρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον, ἤτι ῥητὸν, ἢ μέσον ἐστίν.

Πρότασις κζ. Θεώρημα.

Μέσον μέσων ἐκ ὑπερέχει ῥητῶν.

Λήμμα.

Δύο ἀριθμῶν δοθέντων ἐν λόγῳ ὁποιοῦν, καὶ ἄλλος τινός, δεῖον ποιῆσαι ὡς τὸν ἀριθμὸν πρὸς τὸν δεξιμὸν, ἕτως ἔστιν πρὸς ἄλλον τινά.

Πρότασις κη. πρόβλημα.

Μέσων δεῖν διωάμει μόνον συμμέτρους, ῥητὸν περιεχέσθαι.

Πρότασις κθ. πρόβλημα.

Μέσων δεῖν διωάμει μόνον συμμέτρους μέσον περιεχέσθαι.

Quadratum lineæ medialis applicatum secundum lineam rationalem alterum latus habet lineam rationalem & incommensurabilem longitudine lineæ rectæ secundum quam applicatur.

Propositio 24. Theorema.

Recta quæ lineæ rectæ mediali commensurabilis est & ipsa medialis est.

Propositio 25. Theorema.

Rectangulum quod continetur lineis rectis medialibus longitudine commensurabilibus mediale est.

Propositio 26. Theorema.

Rectangulum quod continetur lineis rectis medialibus potentia tantum commensurabilibus vel est rationale vel mediale.

Propositio 27. Theorema.

Mediale non est maius mediali superficie rationali.

Lemma.

Duobus numeris datis in quacunque ratione & alio numero etiam dato efficere ut se habet numerus ad numerum, ita se habeat ille ad alium aliquem numerum.

Propositio 28. problema.

Mediales inuenire potentia tantum commensurabiles rationale comprehendentes.

Propositio 29. Problema.

Mediales inuenire potentia tantum commensurabiles mediale continentes.

Lem-

Λήμμα.

Εὐρεῖν δύο τετραγώνους ὁρθογώνους, ὡς τε ἔ-
τον συγκείμενον, ἐξ αὐτῶν εἶναι τετράγωνον.

Λήμμα.

Εὐρεῖν δύο τετραγώνους ὁρθογώνους, ὡς τε τὸν
ἐξ αὐτὸν συγκείμενον μὴ εἶναι τετράγωνον.

Λήμμα.

Δύο ἀριθμῶν δοθέντων καὶ ὀρθῆς δεῖν
ποιῆσαι ὡς τὸν ἀριθμὸν, πρὸς τὸν ἀριθμὸν: ἔ-
τως τὸ ἀπὸ τῆς ὀρθῆς τετράγωνον, πρὸς
τὸ ἀπ' ἄλλης πινός.

Πρότασις λ. πρόβλημα.

Εὐρεῖν δύο ῥητὰς διωάμει μόνον συμμε-
τρους ὡς τε πῶ μείζονα τῆς ἐλάτιον \ominus μεί-
ζον διωάδαμ τῶ ἀπὸ συμμετρους ἐαυτῆς μήκει.

Λήμμα.

Εὐρεῖν δύο ῥητὰς, διωάμει μόνον συμμε-
τρους ὡς τε πῶ μείζονα τῆς ἐλάτιον \ominus μεί-
ζον διωάδαμ τῶ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἐαυτῆς
μήκει.

Λήμμα.

Εὰν ὡσι δύο ὀρθῆαι ἐν λόγῳ πινί, ἔσαι ὡς
ἢ εὐθεῖα πρὸς πῶ ὀρθῆαι: ἔτως τὸ ὑπὸ τῶν
δύο πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης.

Πρότα-

Inuenire duos nūeros quadratos tales, vt qui ex ipsis compositus est sit quadratus.

Lemma.

Inuenire duos numeros quadratos tales, vt numerus ex ipsis compositus non sit quadratus.

Lemma.

Duobus numeris datis & linea recta data efficere, vt sicut numerus ad numerum, sic quadratum quod à linea describitur se habeat ad quadratum quod ab alia linea recta describitur.

Propositio 30. problema.

Duas rectas racionales potentia tantum commensurabiles inuenire: ita vt maior plus possit quam minor quadrato, quod describitur à linea recta longitudine sibi commensurabili.

Lemma.

Duas racionales potentia tantum cōmensurabiles inuenire, ita vt maior plus possit quam minor quadrato, quod à linea longitudine sibi incommensurabili describitur.

Lemma.

Si fuerint duæ lineæ rectæ in quadam ratione erit vt recta ad rectam: sic rectangulū quod duabus rectis continetur ad quadratū à minima descriptum.

I. Propo-

Πρότασις δα. πρόβλημα.

Εὐρεῖν δύο μέσας διώμει μόνον συμμετρως ῥητὸν περιεχόσας: ὥστε τὴν μείζονα τὴν ἐλάσσονα Θ μείζον διώαδα τῶ ἀπὸ συμμετρως ἐαυτῆς μήκει.

Λήμμα.

Εὰν ὡς τρεῖς εὐθείαι ἐν λόγῳ πινί, ἔσται ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην: ἔτιως τὸ ὑπὸ τῆς πρώτης καὶ μέσης πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς μέσης καὶ ἐλαχίστης.

Πρότασις λβ. πρόβλημα.

Εὐρεῖν δύο μέσας διώμει μόνον συμμετρως, μέσον περιεχόσας, ὥστε τὴν μείζονα τὴν ἐλάττω Θ μείζον διώαδα, τῶ ἀπὸ συμμετρως ἐαυτῆς.

Πρότασις λγ. πρόβλημα.

Εὐρεῖν δύο εὐθείας διώμει ἀσυμμέτρως, ποιόσας τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων ῥητὸν, τὸ δὲ ὑπὸ αὐτῶν μέσον.

Πρότασις λδ. πρόβλημα.

Εὐρεῖν δύο εὐθείας διώμει ἀσυμμέτρως, ποιόσας τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετρα-

Propositio 31. problema.

Inuenire duas mediales potentia tantum cōmensurabiles rationale continentes, ita vt maior plus possit minore: quadrato quod describitur à recta lōgitudine sibi cōmensurabili

Lemma.

Si fuerint tres lineæ in quadam ratione: erit vt prima ad tertiam sic rectangulū quod prima & media continetur ad rectangulum quod media & maiore continetur.

Propositio 32. Problema.

Duas mediales potentia tantum commensurabiles mediale continentes inuenire ita vt maior plus possit quā minor quadrato, quod à recta sibi commensurabili describitur.

Propositio 33. Problema.

Duas rectas potentia incommensurabiles inuenire, quæ faciant compositum ex quadratis quæ ab ipsis describuntur rationale: rectangulum verò illis contentum mediale.

Propositio 34. problema.

Duas rectas potentia incommensurabiles inuenire: quæ faciant compositum ex qua-

τετραγώνων μέσον τὸ δ' ὑπὸ αὐτῶν ῥητὸν.

Πρότασις λε. πρόβλημα.

Εὐρεῖν δύο εὐθείας διωάμψ ἀσυμμέτρους, ποιῶσας τότε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον, καὶ τὸ ὑπὸ αὐτὸν μέσον, καὶ ἐτι ἀσύμμετρον τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ὑπὸ αὐτῶν τετραγώνων.

Πρότασις λς. θεώρημα.

Εὰν δύο ῥηταὶ διωάμψ μόνον σύμμετροι σωθεῶσιν, ἢ ὅλη ἀλογῶ ἐστίν, καλείσθω δ' ἐκ δύο ὀνομάτων.

Πρότασις λζ. θεώρημα.

Εὰν δύο μέσαι διωάμψ μόνον σύμμετροι σωθεῶσιν ῥητὸν περιέχουσι, ἢ ὅλη ἀλογῶ ἐστίν, καλείσθω δ' ἐκ δύο μέσων πρώτη.

Πρότασις λη. θεώρημα.

Εὰν δύο μέσαι διωάμψ μόνον σύμμετροι σωθεῶσιν μέσον περιέχουσι, ἢ ὅλη ἀλογῶ ἐστίν, καλείσθω δ' ἐκ δύο μέσων δευτέρα.

Πρότασις λθ. θεώρημα.

Εὰν δύο εὐθείαι διωάμψ ἀσύμμετροι σωθεῶσιν, ποιῶσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων ῥητὸν, τὸ δ' ὑπὸ αὐτῶν

τῶν

*dratis ab ipsis descriptis mediale: rectangulū
verò ipsis rectis comprehensum rationale.*

Propositio 35. Problema.

*Duas rectas potentia incommensurabiles
inuenire, quæ faciant compositum ex quadra-
tis, quæ ab ipsis describuntur mediale: & quod
ipsis continetur rectangulum mediale præte-
rea incommensurabile composito ex quadra-
tis quæ ab ipsis describuntur.*

Propositio 36. Theorema.

*Si duæ rationales potentia tantum com-
mensurabiles componantur, tota linea recta
irrationalis est vocetur autem binomium.*

Propositio 37. Theorema.

*Si fuerint duæ mediales potentia tantum com-
mensurabiles compositæ continentis rationale tota irratio-
nalis erit, & vocetur bimediale, aut ex duabus me-
dialibus prima.*

Propositio 38. Theorema.

*Si duæ mediales potentia tantum commensurabi-
les componantur mediale continentis: tota irratio-
nalis erit. vocetur autem bimediale secundum.*

Propositio 39. Theorema.

*Si duæ rectæ potentia commensurabiles componan-
tur consicientes compositum ex quadratis ipsarum ra-*

τῶν μέσον, ἢ ὅλη εὐθεῖα ἄλογός ἐστι, καλεῖσθω δὲ μείζων.

Πρότασις μ. Θεώρημα.

Εὰν δύο εὐθεῖαι διωάμη ἀσύμμετροι σιωτεθῶσι ποιῶσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον, τὸ δ' ὑπὸ αὐτῶν ῥητὸν ἢ ὅλη εὐθεῖα ἄλογός ἐστι, καλεῖσθω δὲ ῥητὸν ἢ μέσον διωαμένη.

Πρότασις μα. Θεώρημα.

Εὰν δύο εὐθεῖαι διωάμη ἀσύμμετροι σιωτεθῶσι, ποιῶσαι τότε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον, καὶ τὸ ὑπὸ αὐτῶν μέσον, καὶ ἐπὶ ἀσύμμετρον τῶν συγκειμένων ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων, ἢ ὅλη εὐθεῖα ἄλογός ἐστι, καλεῖσθω δὲ δύο μέσα διωαμένη.

Πρότασις μβ. Θεώρημα.

Ἡ ἐκ δύο ὀνομάτων, καθ' ἓν μόνον σημεῖον διαρῆται εἰς τὰ ὀνόματα.

Πρότασις μγ. Θεώρημα.

Ἡ ἐκ δύο μέσων πρώτη, καθ' ἓν μόνον σημεῖον διαρῆται, εἰς τὰ ὀνόματα.

Πρό-

tionale & reſtangulum quod illis continetur
mediale tota linea reſta eſt irrationalis, vo-
cetur autem linea maior.

Propoſitio 40. Theorema.

Si due lineæ reſtæ potentia incommenſurabiles
componantur conſcientes compoſitum ex ipſarū qua-
dratis mediale; id verò quod ſit ex ipſis rationale, tota
linea eſt irrationalis. Vocetur autem potens rationale
& mediale.

Propoſitio 41. Theorema.

Si due reſtæ poten-^{ti}ia incommenſurabiles
componantur conſcientes compoſitum ex qua-
dratis ipſarum mediale: & quod continetur
ex ipſis mediale: atq; præterea incommenſu-
rabilis compoſito ex quadratis illarum reſta-
rum: tota linea eſt irrationalis, & vocetur ea
potens duo medialia.

Propoſitio 42. Theorema.

Binomium in vnico tantum puncto diui-
ditur in ſua nomina, id eſt in lineas ex quibus
componitur.

Propoſitio 43. Theorema.

Bimediale prius in vnico tantum pun-
cto diuiditur in ſua nomina.

Πρότασις μδ. Θεώρημα.

Ἡ ἐκ δύο μέσων δεύτερα, καθ' ἓν μόνον σημεῖον διαιρεῖται εἰς τὰ ὀνόματα.

Πρότασις με. Θεώρημα.

Ἡ μείζων κατὰ τὸ αὐτὸ μόνον σημεῖον διαιρεῖται εἰς τὰ ὀνόματα.

Πρότασις μς. Θεώρημα.

Ἡ ῥητὴν ἢ μέσον δυναμένη, καθ' ἓν μόνον σημεῖον διαιρεῖται εἰς τὰ ὀνόματα.

Πρότασις μζ. Θεώρημα.

Ἡ δύο μέσα δυναμένη, καθ' ἓν μόνον σημεῖον διαιρεῖται, εἰς τὰ ὀνόματα.

Πρότασις μη. πρόβλημα.

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτῃ.

Πρότασις μθ. πρόβλημα.

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων δεύτερα.

Πρότασις ν. πρόβλημα.

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων τρίτῃ.

Πρότασις να. Θεώρημα.

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων τετάρτῃ.

Πρότασις νβ. Θεώρημα.

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων πέμπτῃ.

Πρότασις

Propositio 44. Theorema.

Bimediale secundū in vnico tantum puncto diuiditur in sua nomina.

Propositio 45. Theorema.

Linea maior in vnico tantum puncto diuiditur in sua nomina.

Propositio 46. Theorema.

Linea recta potens rationale & mediale, in vnico tantum puncto diuiditur in sua nomina.

Propositio 47. Theorema.

Linea potens duo medialia in vnico tantum puncto diuiditur in sua nomina.

Propositio 48. Problema.

Inuenire binomium primum.

Propositio 49. Problema.

Inuenire binomium secundum.

Propositio 50. problema.

Inuenire binomium tertium.

Propositio 51. problema.

Inuenire binomium quartum.

Propositio 52. problema.

Inuenire binomium quintum.

I v

Pro-

πρότασις νγ. πρόβλημα.

Εὐρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων ἑκτῶν.

πρότασις νδ. θεώρημα.

Ἐὰν χωρίον περιέχηται ὑπὸ ῥητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτης, ἢ τὸ χωρίον διωαμένη, ἀλογός ἐστιν, ἢ καλεσμένη ἐκ δύο ὀνομάτων.

πρότασις νε. θεώρημα.

Ἐὰν χωρίον περιέχηται ὑπὸ ῥητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων δευτέρας, ἢ τὸ χωρίον διωαμένη, ἀλογός ἐστιν, ἢ καλεσμένη ἐκ δύο μέσων πρώτη.

πρότασις νς. θεώρημα.

Ἐὰν χωρίον περιέχηται ὑπὸ ῥητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τρίτης, ἢ τὸ χωρίον διωαμένη, ἀλογός ἐστιν, ἢ καλεσμένη ἐκ δύο μέσων δευτέρα.

πρότασις νζ. θεώρημα.

Ἐὰν χωρίον περιέχηται ὑπὸ ῥητῆς, καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τετάρτης, ἢ τὸ χωρίον διωαμένη, ἀλογός ἐστιν, ἢ καλεσμένη μείζων.

πρότασις νη. θεώρημα.

Ἐὰν χωρίον περιέχηται ὑπὸ ῥητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο

Propositio 53. problema.

Inuenire binomium sextum.

Propositio 54. Theorema.

Si superficies aliqua contenta fuerit rationali & binomiali primo, linea quæ illam potest superficiem est irrationalis, quæ nominatur binomium.

Propositio 55. Theorema.

Si superficies aliqua continetur rationali & binomiali secundo, linea, quæ illam potest rationalis est, quæ nominatur bimediale primum.

Propositio 56. Theorema.

Si superficies continetur rationali & binomio tertio, recta quæ illam potest irrationalis est, quæ vocatur bimediale secundum.

Propositio 57. Theorema.

Si superficies continetur rationali & binomio quarto, recta quæ illam potest irrationalis est, & vocatur maior.

Propositio 58. Theorema.

Si superficies continetur rationali & binomio

ἐκ δύο ὀνομάτων πέμπτης, ἢ τὸ χωρίον δυναμένη, ἄλογός ἐστιν, ἢ καλεσμένη ῥητὸν καὶ μέσον διωαμένη.

Πρότασις νθ. Θεώρημα.

Εὰν χωρίον περιέχεται ὑπὸ ῥητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων ἑκτῆς, ἢ τὸ χωρίον δυναμένη, ἄλογός ἐστιν ἢ καλεσμένη δύο μέσων διωαμένη.

Πρότασις ξ. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον, πλάτος, ποιῆται ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτης.

Πρότασις ξα. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ τῆς ἐκ δύο μέσων πρώτης παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιῆται ἐκ δύο ὀνομάτων δευτέρας.

Πρότασις ξβ. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ τῆς ἐκ δύο μέσων δευτέρας παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιῆται ἐκ δύο ὀνομάτων τρίτης.

Πρότασις ξγ. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ τῆς μείζονος παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιῆται ἐκ δύο ὀνομάτων τετάρτης.

nomio quinto, recta quæ illam potest irrationalis est, quæ vocatur potens rationale & mediale.

Propositio 59. Theorema.

Si superficies continetur rationali & binomio sexto, recta quæ illâ potest irrationalis est quæ vocatur potens duo medialia.

Propositio 60. Theorema.

Quadratum binomij applicatum lineæ rationali facit alterum latus binomium primû.

Propositio 61. Theorema.

Quadratum bimedialis primi applicatum rationali alterum latus facit binomium secundum.

Propositio 62. Theorema.

Quadratum bimedialis secundi rationali applicatum, facit alterum latus binomium tertium.

Propositio 63. Theorema.

Quadratum lineæ maioris applicatum rationali: facit alterum latus binomiû quartum.

Pro-

Πρότασις ξδ. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ τῆς ῥητὸν καὶ μέσον διωαμένης
παρὰ ῥητῷ παραβαλλόμενον, πλάτος ποιῆ
τῷ ἐκ δύο ὀνομάτων πέμπτῳ.

Πρότασις ξε. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ τῆς δύο μέσα διωαμένης παρὰ
ῥητῷ παραβαλλόμενον πλάτῳ, ποιῆ τῷ
ἐκ δύο ὀνομάτων ἕκτῳ.

Πρότασις ξς. Θεώρημα.

Ἡ τῆ ἐκ δύο ὀνομάτων μήκει σύμμετρος,
καὶ αὐτὴ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ, καὶ τῆ τάξει
ἢ αὐτῆ.

Πρότασις ξζ. Θεώρημα.

Ἡ τῆ ἐκ δύο μέσων μήκει σύμμετρος,
ἐκ δύο μέσων ἐστὶ, καὶ τῆ τάξει ἢ αὐτῆ.

Πρότασις ξη. Θεώρημα.

Ἡ τῆ μείζονι σύμμετρος, καὶ αὐτὴ μείζων
ἐστίν.

Πρότασις ξθ. Θεώρημα.

Ἡ τῆ ῥητὸν καὶ μέσον διωαμένη σύμμε-
τρος, καὶ αὐτῆ ῥητὸν καὶ μέσον διωαμένη
ἐστίν.

Propositio 64. Theorema.

Quadratum lineæ potentis rationale & mediale, applicatum rationali: facit alterum latus binomium quintum.

Propositio 65. Theorema.

Quadratum lineæ potentis duo medialia applicatum rationali facit alterum latus binomium sextum.

Propositio 66. Theorema.

Linea longitudine commensurabilis binomio: & ipsa binomium est, & eiusdem ordinis.

Propositio 67. Theorema.

Linea longitudine commensurabilis bimediali, & ipso bimediale est, & eiusdem ordinis.

Propositio 68. Theorema.

Linea commensurabilis lineæ maiori, & ipsa maior est.

Propositio 69. Theorema.

Linea commensurabilis lineæ potenti rationale & mediale & ipsa potens rationale et mediale est.

Propo-

πρότασις ο. Θεώρημα.

Ἡ τῆ δύο μέσα διωαμένη σύμμετρος, δύο μέσα διωαμένη ἐστίν.

πρότασις οα. Θεώρημα.

Ῥητῶ καὶ μέσῃ σωπιθεμένῃ, τέσσαρες ἄλογοι γίνονται, ἢ ἅκ δύο ὀνομάτων, ἢ ἅκ δύο μέσων πρώτη, ἢ μείζων, ἢ καὶ ῤητὸν ἔ μέσον διωαμένη.

Πρότασις οβ. Θεώρημα.

Δύο μέσων ἄσυμμέτρων ἀλλήλοις σωπιθεμένων, αἱ λοιπαὶ δύο ἄλογοι γίνονται, ἢ τῶ ἢ ἅκ δύο μέσων δεύτερα, ἢ ἡ δύο μέσα διωαμένη.

Δεύτερα τάξις ἐτέρων λόγων τῶν κατὰ ἀφαίρεσιν.

Ἀρχὴ τῶν κατὰ ἀφαίρεσιν ἐξάδων.

Πρότασις ογ. Θεώρημα.

Ἐὰν ἀπὸ ῤητῆς ῤητῆ ἀφαιρεθῆ, διωαμὴ μόνον σύμμετρος ἔσῃ τῆ ἄλλῃ, ἢ λοιπῆ ἄλογος ἐστίν, καλεῖσθω δὲ ἀποτομή.

πρότα-

Propositio 70. Theorema.

Linea commensurabilis lineæ potenti duo medialia & ipsa potens est duo medialia.

Propositio 71. Theorema.

Si duæ superficies rationalis & medialis componantur, linea, quæ totam superficiem compositam potest, est una ex quatuor irrationalibus, vel ea quæ dicitur binomium, vel bimediale primum, vel linea maior, vel linea potens rationale & mediale.

Propositio 72. Theorema.

Si duæ superficies mediales incommensurabiles componantur, fient duæ reliquæ lineæ irrationales vel bimediale secundum, vel linea potens duo medialia.

Secundus ordo alterius orationis
quæ est de subtractione.

Principium senariorum per subtractionem.

Propositio 73. Theorema.

Si à rationali auferatur rationalis potentia tantum commensurabilis ipsi toti; tum reliqua irrationalis est, vocetur autem residuum.

K Pro-

Πρότασις οδ. Θεώρημα.

Εὰν ἀπὸ μέσης μέση ἀφαιρεθῆ, δυνάμει
μόνον σύμμετρος ᾗ ἅσα τῆ ὅλη, μετὰ δὲ τῆς
ὅλης ῥητὸν περιμέχη, ἢ λοιπὴ ἄλογος ἐστὶ, κα-
λεῖσθω δὲ μέσης διχοτομὴ πρώτη.

πρότασις οε. Θεώρημα.

Εὰν ἀπὸ μέσης μέση ἀφαιρεθῆ δυνάμει
μόνον σύμμετρος ᾗ ἅσα τῆ ὅλη, μετὰ δὲ τῆς ὅ-
λης μέσον περιμέχη, ἢ λοιπὴ ἄλογος ἐστὶ,
καλεῖσθω ἡ μέσης ἀπόλοιμή δεύτερα.

πρότασις ος. Θεώρημα.

Εὰν ἀπὸ δυνάμει δυνάμει ἀφαιρεθῆ, δυ-
νάμει ἀσύμμετρος ᾗ ἅσα τῆ ὅλη, μετὰ δὲ τῆς
ὅλης ποιῆσαι τὸ μὲν ἀπὸ αὐτῶν ἅμα ῥητὸν,
τὸ δὲ ὑπὸ αὐτῶν μέσον, ἢ λοιπὴ ἄλογος ἐ-
στὶ, καλεῖσθω δὲ ἐλάσσων.

Πρότασις οζ. Θεώρημα.

Εὰν ἀπὸ δυνάμει δυνάμει ἀφαιρεθῆ δυνά-
μει ἀσύμμετρος οὖσα τῆ ὅλη, μετὰ ἡ τῆς ὅλης
ποιῆσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ αὐτῶν
πτετραγώνων μέσον, τὸ δὲ ἄλλο ὑπὸ αὐτῶν ῥη-
τὸν ἢ

Propositio 74. Theorema.

Si à linea mediali auferatur medialis potentia tantum commensurabilis ipsi toti, quæ verò ablata est cum tota contineat superficiem rationalem, residua irrationalis est, vocetur autem residuum mediale primum.

Propositio 75. Theorema.

Si de linea mediali detrahatur medialis potentia tantum commensurabilis toti: quæ vero detracta est cum tota contineat superficiem medialem reliqua irrationalis est, vocetur autem residuum mediale secundum.

Propositio 76. Theorema.

Si auferatur à linea recta, quædam alia potentia incōmensurabilis toti, compositum autem ex quadratis totius lineæ et lineæ ablatae sit rationale: & quod illis continetur sit mediale, reliqua linea irrationalis erit, vocetur autem linea minor.

Propositio 77. Theorema.

Si à linea recta auferatur recta potentia incōmensurabilis toti lineæ, compositum autem ex quadratis totius & lineæ ablatae sit mediale, quod verò illis continetur sit rationale reliqua linea irrationalis erit vo-

τὸν ἢ λοιπὴν ἄλογον ἐστὶ, καλείσθω δὲ μετὰ
ῤητῶ μέσον τὸ ὅλον ποιῶσα.

Πρότασις οη. Θεώρημα.

Ἐὰν ἀπὸ Διθέας Διθεῖα ἀφαιρεθῆ, δυνά-
μις ἀσύμμετρος ἔσται τῆ ὅλης, μὲν δὲ τῆς ὅλης
ποιῶσα τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶ ἀπὸ αὐτῶν
πετραγῶνων μέσον, ἐπι δὲ τὰ ἀπὸ αὐτῶν πε-
τραγῶνα ἀσύμμετρα τῶ δὲ ἰσὺ ἀπὸ αὐτῶν, ἢ
λοιπὴν ἄλογος ἐστὶ, καλείσθω δὲ ἢ μὲν μέσου,
μέσον τὸ ὅλον ποιῶσα.

Πρότασις οθ. Θεώρημα.

Τῆ ἀποτομῆ, μία μόνον προσαρμόζει Δι-
θεῖα ῤητῆ δυνάμις μόνον σύμμετρος ἔσται τῆ
ὅλης.

Πρότασις πα. Θεώρημα.

Τῆ μέση ἀποτομῆ πρώτη μόνον μία προ-
σαρμόζει Διθεῖα μέση, δυνάμις μόνον σύμμε-
τρος ἔσται τῆ ὅλης: μὲν δὲ τῆς ὅλης ῤητὸν πε-
ριέχουσα.

Πρότασις πβ. Θεώρημα.

Τῆ μέση ἀποτομῆ δεύτερα μία μόνον
προσαρμόζει Διθεῖα μέση, δυνάμις μόνον σύμ-
μετρος ἔσται τῆ ὅλης, μὲν δὲ τῆς ὅλης μέσον
περιέχουσα.

etetur autem linea faciens cum superficie rationali totam superficiem medialem.

Propositio 78. Theorema.

Si à linea recta auferatur recta potentia incōmensurabilis toti lineæ, compositum autem ex quadratis totius & lineæ detractæ sit mediale, quod verò illis continetur etiam sit mediale: præterea quadrata ipsarum sunt incōmensurabilia ei quod illis continetur: reliqua linea irrationalis est, vocetur autem linea faciens cum superficie mediali totam superficiem medialem.

Propositio 79. Theorema.

Residuo vnica tantum linea recta coniungitur rationalis potentia tantum commensurabilis toti lineæ.

Propositio 80. Theorema.

Residuo mediali primo vnica tantum linea coniungitur medialis potentia tantum commensurabilis toti, ipsa cum tota, continens rationale.

Propositio 81. Theorema.

Residuo mediali secundo vnica tantum coniungetur medialis potentia tantum cōmensurabilis toti, ipsa cum tota cōtinens mediale.

Πρότασις πβ. Θεώρημα.

Τῆ ἐλάσσονι μία μόνον προσαρμόζη δὲ
θεῖα δυνάμη ἀσύμμετρον ἔσται τῆ ὅλη πι-
εδοσα μὲ τῆς ὅλης, τὸ μὲν ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν
τετραγώνων ῥητόν, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν μέσον.

Πρότασις πγ. Θεώρημα.

Τῆ μετὰ ῥητῶν μέσον τὸ ὅλον ποιῆσθαι μία
μόνον προσαρμόζη δὲ θεῖα, δυνάμη ἀσύμμε-
τρον ἔσται τῆ ὅλη: μετὰ δὲ τῆς ὅλης ποιῆσθαι
τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετρα-
γώνων μέσον, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν ῥητόν.

Πρότασις πδ. Θεώρημα.

Τῆ μετὰ μέσων μέσον τὸ ὅλον ποιῆσθαι, μία
μόνον προσαρμόζη δὲ θεῖα, δυνάμη ἀσύμμε-
τρον ἔσται τῆ ὅλη: μὲν δὲ τῆς ὅλης ποιῆσθαι τὸ
μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώ-
νων μέσον, τὸ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν μέσον, καὶ ἐπὶ
ἀσύμμετρον τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐ-
τῶν, τὰ δὲ δις ὑπ' αὐτῶν.

Πρότασις πε. πρόβλημα.

Εὐρεῖν τὴν πρώτην ἀποδομὴν.

Propositio 82. Theorema.

Linea minori vnica tantum recta coniungitur potentia incommensurabilis toti faciens cum tota compositum ex quadratis ipsarū rationale: id verò quod illis cōtinetur mediale.

Propositio 83. Theorema.

Linea facienti cum superficie rationali totam superficiem medialem vnica tantū coniungitur linea recta potentia incōmensurabilis toti: faciens autem cum tota compositum ex quadratis ipsarum mediale id verò quod fit ex ipsis rationale.

Propositio 84. Theorema.

Linea cum mediali superficie facienti totam superficiem medialem vnica tantum coniungitur linea potentia toti incōmensurabilis, faciēs cum tota compositum ex quadratis ipsarū mediale: id verò quod fit ex ipsis etiam mediale, & præterea faciens compositum ex quadratis ipsarum incōmensurabile ei quod ex ipsis fit.

Propositio 85. problema.

Primum residuum inuenire.

Πρότασις πς. πρόβλημα.
Εὐρεῖν τὴν δευτέραν ἀποδομὴν.

Πρότασις πζ. πρόβλημα.
Εὐρεῖν τὴν τρίτην ἀποδομὴν.

Πρότασις πη. πρόβλημα.
Εὐρεῖν τὴν τετάρτην ἀποδομὴν.

Πρότασις πθ. πρόβλημα.
Εὐρεῖν τὴν πέμπτην ἀποδομὴν.

Πρότασις ς. πρόβλημα.
Εὐρεῖν τὴν ἑκτὴν ἀποδομὴν.

Πρότασις ζα. θεώρημα.
Εὰν χωρίον περιέχηται ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀποδομῆς πρώτης ἢ τὸ χωρίον διωαμένη, ἀποδομὴ ἐστίν.

Πρότασις ζβ. θεώρημα.
Εὰν χωρίον περιέχηται ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀποδομῆς δευτέρας, ἢ τὸ χωρίον διωαμένη μέσης ἀποδομῆς ἐστὶ πρώτη.

Πρότασις ζγ. θεώρημα.
Εὰν χωρίον περιέχηται ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀποδομῆς τρίτης, ἢ τὸ χωρίον διωαμένη μεσῆς ἀποδομῆς ἐστὶ δευτέρα.

Propositio 86. problema.

Secundum residuum inuenire.

Propositio 87. problema.

Tertium residuum inuenire.

Propositio 88. problema.

Quartum residuum inuenire.

Propositio 89. problema.

Quintum residuum inuenire.

Propositio 90. problema.

Sextum residuum inuenire.

Propositio 91. Theorema.

Si superficies contineatur linea rationali,
& residuo primo linea quæ illam superficiem
potest, est residuum.

Propositio 92. Theorema.

Si superficies contineatur linea rationali
& residuo secundo, linea quæ illam superficiem
potest, est residuum mediale primum.

Propositio 93. Theorema.

Si superficies continetur linea rationali,
& residuo tertio, linea quæ illam superficiem
potest, est residuum rationale secundum.

K 7 Pro-

Πρότασις 5δ. Θεώρημα.

Εὰν χωρίον περιεχῆται ὑπὸ ῥητῆς, καὶ ἀπομοῆς τετάρτης, ἢ τὸ χωρίον διωαμένη ἐλάσων ἐστὶ.

Πρότασις 5ε. Θεώρημα.

Εὰν χωρίον περιεχῆται ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀπομοῆς πέμπτης, ἢ τὸ χωρίον διωαμένη ἢ μὲν ῥητῆ μέσον τὸ ὅλον ποιῶσα ἐστὶ.

Πρότασις 5ς. Θεώρημα.

Εὰν χωρίον περιεχῆται ὑπὸ ῥητῆς, καὶ ἀπομοῆς ἑκτῆς, ἢ τὸ χωρίον διωαμένη μὲν μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιῶσα ἐστὶ.

Πρότασις 5ζ. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ ἀπομοῆς παρὰ ῥητῶν παραβαλλόμενον πλάττει ποιῆ ἀπομοῆν πρώτην.

Πρότασις 5η. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ μέσης ἀπομοῆς πρώτης, παρὰ ῥητῶν παραβαλλόμενον πλάττει ποιῆ ἀπομοῆν δεύτεραν.

Πρότασις 5θ. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ μέσης ἀπομοῆς δεύτερας παρὰ ῥητῶν

Propositio 94. Theorema.

Si superficies continetur rationali & residuo quarto recta quæ illam potest superficiem est minor linea.

Propositio 95. Theorema.

Si superficies continetur rationali & residuo quinto, recta quæ illam superficiem potest, est ea quæ dicitur cum rationali faciens totam medialem.

Propositio 96. Theorema.

Si superficies continetur rationali, & residuo sexto, recta quæ illam potest est ea quæ dicitur faciens cum mediali totam medialem.

Propositio 97. Theorema.

Quadratum residui secundum lineam rationalem applicatum, facit alterum latus residuum primum.

Propositio 98. Theorema.

Quadratum residui medialis primi applicatum rationali facit alterum latus residuum secundum.

Propositio 99. Theorema.

Quadratum residui medialis secundi applica-

ῥητῶ παραβαλλόμενον πλάτθ ποιῆ δίοπομῶ τρίτῳ.

Πρότασις ρ. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ ελάσσονθ παρα ῥητῶ παραβαλλόμενον πλάτθ ποιῆ ἀπολομῶ πτέρτῳ.

Πρότασις ρα. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ τῆς μεῖα ῥητῆ μέσον τὸ ὅλον ποιῆσθ παρα ῥητῶ παραβαλλόμενον πλάτθ ποιῆ δίοπομῶ τέμπτεῳ.

Πρότασις ρβ. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ τῆς μετῆ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιῆσθ παρα ῥητῶ παραβαλλόμενον πλάτθ ποιῆ δίοπομῶ ἐκτῳ.

Πρότασις ργ. Θεώρημα.

Ἡ τῆ δίοπομῆ μήκει σύμμετροθ, δίοπομῆ ἐστὶν καὶ τῆ τάξθ ἡ αὐτῆ.

Πρότασις ρδ. Θεώρημα.

Ἡ τῆ μέσθ δίοπομῆ σύμμετροθ, μέσθ ἀπολομῆ ἐστὶν, καὶ τῆ τάξθ ἡ αὐτῆ.

Πρό-

plicatum rationali facit alterum latus residuum tertium.

Propositio 100. Theorema.

Quadratum lineæ minoris, applicatum rationali, facit alterum latus residuum quartum.

Propositio 101. Theorema.

Quadratum lineæ cum rationali superficie facientis totam medialem applicatum rationali facit alterum latus residuum quintum.

Propositio 102. Theorema.

Quadratum lineæ cum mediali superficie facientis totam medialem applicatum rationali facit alterum latus residuum sextum.

Propositio 103. Theorema.

Linea recta cõmensurabilis residuo longitudine, est & ipsa residuum & eiusdem ordinis.

Propositio 104. Theorema.

Linea commensurabilis residuo mediali, est & ipsa residuum mediale, & eiusdem ordinis.

Propo-

Πρότασις ρε. Θεώρημα.

Ἡ τῆ ἐλάσωνι σύμμετρος \odot ἐλάσων ἐ-
στίν.

Πρότασις ρς. Θεώρημα.

Ἡ τῆ μὲ ρητῶ μέσον τὸ ὅλον ποιῶσα σύμ-
μετρος \odot , καὶ αὐτὴ μεία ρητῶ μέσον τὸ ὅλον
ποιῶσα ἐστίν.

Πρότασις ρζ. Θεώρημα.

Ἡ τῆ μὲ μέσων μέσον τὸ ὅλον ποιῶσα σύμ-
μετρος \odot , καὶ αὐτὴ μεία μέσων μέσον τὸ ὅλον
ποιῶσα ἐστίν.

Πρότασις ρη. Θεώρημα.

Ἀπὸ ρητῶ μέσων ἀφαιραμένων, ἢ τὸ λοι-
πὸν χωρίον διωαμένη, μία δύο ἀλόγων γί-
νεται, ἢ τοι ἀπολομὴ ἢ ἐλατίων.

Πρότασις ρθ. Θεώρημα.

Ἀπὸ μέσων ρητῶ ἀφαιραμένων, ἄλλαι δύο
ἀλογοὶ γίνονται, ἢ τοι μέση ἀπολομὴ πρῶτης,
ἢ μεία ρητῶ τὸ ὅλον ποιῶσα.

πρότα-

Propositio 105. Theorema.

Linea commensurabilis lineæ minori & ipsa linea minor est.

Propositio 106. Theorema.

Linea commensurabilis lineæ cum rationali superficie facienti totam medialem, est & ipsa linea cum rationali superficie faciens totam medialem.

Propositio 107. Theorema.

Linea commensurabilis lineæ cum mediali superficie facienti totam medialem commensurabilis est, & ipsa cum mediali superficie faciens totam medialem.

Propositio 108. Theorema.

Si auferatur de superficie rationali superficies medialis, linea quæ reliquam superficiem potest est alterutrum ex duabus irrationalibus aut residuum aut linea minor.

Propositio 109. Theorema.

Si auferatur à superficie mediali rationalis superficies, aliæ duæ irrationales fiunt aut residuum mediale primum, aut cum rationale superficie faciens totam medialem.

Pro-

πρότασις ρι. Θεώρημα.

Από μέσων, μέσων αφαιρούμενων ασυμμέτρων τῶ ὅλῳ, αἰ λοιπαὶ δύο ἄλογοι γίνονται, ἢ τοῖς μέσῃ διπολομῇ δίδυτέρα, ἢ μὲν μέσων μέσον τὸ ὅλον ποιεῖται.

Πρότασις ρια. Θεώρημα.

Ἡ διπολομὴ ἐκ ἐστὶν ἡ αὐτὴ τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων.

Πρότασις ριβ. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ ῥητῆς παρὰ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων παραβαλλόμενον, πλάττει ποιεῖ διπολομὴν ἣς τὰ ὀνόματα, σύμμετρα ἐστὶ τοῖς ἐκ δύο ὀνομάτων ὀνόμασι, καὶ ἐπὶ τῶ αὐτῶ λόγῳ, ἔστι ἡ γινομένη διπολομὴ, τὴν αὐτὴν ἔχει τάξιν, τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων.

Πρότασις ριγ. Θεώρημα.

Τὸ ἀπὸ ῥητῆς παρὰ διπολομὴν παραβαλλόμενον πλάττει ποιεῖ, τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων, ἣς τὰ ὀνόματα, σύμμετρα τῆς διπολομῆς ὀνόμασι, καὶ ἐν τῶ αὐτῶ λόγῳ. ἐπὶ δὲ ἡ γινομένη ἐκ δύο ὀνομάτων τὴν αὐτὴν τάξιν ἔχει τῇ διπολομῇ.

πρότα-

Propositio 110. Theorema.

Si auferatur à mediali superficies medialis incommensurabilis toti: fiunt reliquæ duæ irracionales aut residuum mediale secundum aut cum mediali superficie faciens totam mediam.

Propositio 111. Theorema.

Linea quæ residuum dicitur non est eadẽ cum ea quæ binomium appellatur.

Propositio 112. Theorema.

Quadratum lineæ rationalis applicatum binomio, facit alterum latus residuum, cuius nomina sunt commensurabilia binomij nominibus, & ei eadem proportione: præterea id quod fit residuum eundem ordinem retinet quem binomium.

Propositio 113. Theorema.

Quadratum lineæ rationalis applicatum residuo: facit alterum latus binomium, cuius nomina sunt commensurabilia nominibus residui & in eadem proportione, præterea id quod fit binomium est eiusdem ordinis cuius & residuum.

L Propo-

Πρότασις ριδ. Θεώρημα.

Εὰν χωρίον περιέχηται ὑπὸ ἀποτομῆς,
καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων, ἧς τὰ ὀνόματα σύμ-
μετρὰ ἔσιν τοῖς τῆς ἀποτομῆς ὀνόμασι, καὶ ἐ-
πι αὐτῷ λόγῳ ἢ τὸ χωρίον διωαμένη ῥητὴ
ἔσιν.

Πρότασις ριε. Θεώρημα.

Ἀπὸ μέσης ἀπειροὶ ἀλογοὶ γίνονται, καὶ
ἕδεμια ἕδεμια τῶν προτέρων ἢ αὐτῆ.

Πρότασις ρις. Θεώρημα.

Προκείσθω ἡμῖν δεῖξαι, ὅτι ἐπι τῶν τετρα-
γώνων σχημάτων, ἀσύμμετρον ἔστιν ἢ ἀλό-
μετρον τῆ πλάτῃ μήκει.

Τέλος τῶν δεκάτῃ στοιχείῃ.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΙΑ,
ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΝ.

ΟΡΟΙ.

Στερεόν ἐστὶ τὸ μήκῃ, καὶ πλάτῃ, καὶ
βάθῃ ἔχον.

Στερεῶν δὲ πέντε ἐπιφάνειαι

εὐθεῖαι

Propositio 114. Theorema.

Si superficies continetur residuo & binomio, cuius nomina sunt commensurabilia nominibus residui & in eadē proportione, linea quæ illam superficiem potest esse rationalis.

Propositio 115. Theorema.

Ex linea mediali nascuntur innumerabiles lineæ irrationales, quarum nulla cum ante dictis sit eadem.

Propositio 116. Theorema.

Propositum nobis sit demonstrare in figuris quadratis diametrum esse longitudinē incommensurabilem ipsi lateri.

Finis Decimi Libri.

**EVCLIDIS ELEMENTO-
RVM VNDECIMVS ET STEREO
metriæ primus.**

Definitiones.

Corpus solidum est quod habet longitudinem, latitudinem, & profunditatē.
Corporis solidi extremitas est superficies.

L ij Li-

Εὐθεία πρὸς ἴπίπεδον ὀρθὴ ἐστίν, ὅταν πρὸς πάσας τὰς ἀπιόμενας αὐτῆς ὀθείας, καὶ ἕσας ἐν τῷ αὐτῷ ὑποκείμενῷ ἐπιπέδῳ, ὀρθὰς ποιῇ γωνίας.

Ἐπίπεδον πρὸς ἴπίπεδον ὀρθον ἐστίν, ὅταν αἰ τῇ κοινῇ τομῇ τῶν ἴπιπέδων πρὸς ὀρθὰς ἀγόμεναι ὀθείαι ἐν ἐνὶ τῶν ἴπιπέδων, τὰ λοιπῶν ἴπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ᾖσιν.

Εὐθείας πρὸς ἴπίπεδον κλίσις ἐστίν, ὅταν ἀπὸ τῆς μετεώρου πέρατος τῆς ὀθείας ἴπι τὸ ἴπίπεδον κάθεται ἀχθῆ, καὶ ἀπὸ τῆς γνομένης σημείας, καὶ ἀπὸ τῆς ἐν τῷ ἴπιπέδῳ πέρατος τῆς ὀθείας, ὀθεῖα ἴπι ἀχθῆ, ἢ περιεχομένη ὀξεία γωνία ὑπὸ τῆς ἀχθείσης καὶ τῆς ἐφεσώσης.

Ἐπιπέδον πρὸς ἴπίπεδον κλίσις ἐστίν, ἢ περιεχομένη ὀξεία γωνία, ὑπὸ τῶν πρὸς ὀρθὰς τῇ κοινῇ τομῇ ἀγομένων, πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ ἐν ἑκατέρῳ τῶν ἴπιπέδων.

Ἐπίπεδον πρὸς ἴπίπεδον ὁμοίως κεκλιδομαι λέγεται, καὶ ἕτερον πρὸς ἕτερον, ὅταν αἰ ἐρημένα τῶν κλίσεων γωνία ἴσται ἀλλήλαις ᾖσι.

Παράλ-

Linea recta ad planum aliquod dicetur esse erecta, quando illa linea recta ad omnes quae eam tangunt & in eodem subiecto plano existunt rectas, fecerit angulos rectos.

Planum ad alterum planum erit erectum quando lineae rectae ad angulos rectos ductae in communi planorum intersectione in altero planorum, reliquo plano ad angulos rectos fuerint.

Lineae rectae ad planum inclinatio erit, quando à puncto sublimi ad ipsum planum ducta fuerit linea rectae perpendicularis & à puncto facto, atq; extremitate vna lineae rectae in plano ducatur linea recta, angulis inquam ille acutus, quem continent linea recta ducta & recta linea perpendicularis.

Plani inclinatio ad planum erit angulus acutus, quem continent lineae rectae ad angulos rectos ductae in communi sectione, ad vnũ idemq; punctum in vtroq; plano.

Planum ad aliud planum similiter inclinatum esse dicitur, & aliud quoddam planum ad aliud planum: quando anguli inclinationum fuerint aequales inter se.

Παράλληλα ὀπίπεδα ἐστὶ τὰ ἀσύμπτωτα. Ὁμοια στερεὰ σχήματα ἐστὶ, τὰ ὑπὸ ὁμοίων ὀπιπέδων περιεχόμενα, ἴσων τῷ πλήθει.

Ἰσα ἢ καὶ ὁμοια στερεὰ σχήματα ἐστὶ, τὰ ὑπὸ ὁμοίων ὀπιπέδων περιεχόμενα, ἴσων τῷ πλήθει καὶ τῷ μεγέθει.

Στερεὰ γωνία ἐστὶν, ἢ ὑπὸ πλῆθόνων ἢ δύο γραμμῶν ἀπιομένων ἀλλήλων, καὶ μὴ ἐν τῇ αὐτῇ ὀπιφανείᾳ ἔσῶν πρὸς πᾶσιν τὰς γραμμὰς κλίσις.

Στερεὰ γωνία ἐστὶν, ἢ ὑπὸ πλείονων ἢ δύο ὀπιπέδων γωνιῶν περιεχομένη, μὴ ἔσῶν ἐν τῷ αὐτῷ ὀπιπέδῳ, πρὸς ἐνὶ σημείῳ συντεταμένων.

Πυραμὶς ἐστὶ σχῆμα στερεὸν ὀπιπέδοις περιεχόμενον ἀπὸ ἐνὸς ὀπιπέδου πρὸς ἐνὶ σημείῳ συνεσῶς.

Πρίσμα ἐστὶ σχῆμα στερεῶν, ὀπιπέδοις περιεχόμενον, ὧν δύο τὰ ἀπεναντίον, ἴσα τὲ καὶ ὁμοια ἐστὶ, καὶ παράλληλα τὰ δὲ λοιπὰ, παραλληλόγραμμα.

Σφαιρὰ ἐστὶν, ὅταν ἡμικυκλίᾳ μὲν ἄσπης τῆς ἀσμέτρως, περιεχθῆν τὸ ἡμικύκλιον, εἰς τὸ αὐτὸ

Plana aequedistantia sunt, quae nunquam concurrunt.

Figurae solidae similes sunt: quae continentur planis similibus & numero aequalibus.

Aequales verò & similes figurae solidae sunt, quae planis continentur similibus, aequalibus numero, & magnitudine.

Angulus solidus est plurimum quam duarum linearum rectarum sese mutuo tangentium, & in vno plano minime existetium ad omnes lineas inclinatio. Aliter.

Angulus solidus est qui pluribus quàm duobus angulis planis continentur, qui non in eodẽ sunt plano, & ad vnũ constituuntur punctum.

Pyramis est figura solida planis contenta, quae constituitur ex vno plano ad vnum aliquod punctum.

Prisma est figura solida planis contenta, quorum duo opposita aequalia & similia atque aequedistantia sunt, reliqua verò parallelogramma.

Sphaera est figura solida, quae fit quando manente semicirculi diametro ipse semicirculus

αὐτὸ πάλιν ἀποκτῆσθαι, ὅθεν ἤρξατο φέρεσθαι, τὸ περιληφθὲν σχῆμα.

Ἀξων δὲ τῆς σφαιρας ἐσὶν, ἡ μένεται δὲ θεῖα, ὡς ἰὼ τὸ ἡμικύκλιον σρέφεται.

Κέντρον δὲ τῆς σφαιρας ἐστὶ τὸ αὐτὸ, ὃ καὶ τῷ ἡμικυκλίῳ.

Διάμετρος Θ δὲ τῆς σφαιρας ἐσὶν, ὡς θεῖα τίς ἀπὸ τῶν κέντρων ἡγμένη, καὶ περατῆμένη ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη, ὑπὸ τῆς ἑπιφανείας τῆς σφαιρας.

Κῶν Θ ἐσὶν, ὅταν ὀρθογωνία τρίγωνά μιν ἴσως πλάγῃας, τῶν ὡς ἰὼ τῷ ὀρθῷ γωνίᾳ, περιενοχθὲν τὸ τρίγωνον, εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν ἀποκατασταθῆ, ὅπεν ἤρξατο φερέσθαι τὸ περιληφθὲν σχῆμα, καὶ ἡ μένεται δὲ θεῖα αἴση τῆ λοιπῆ τῆ ὡς ἰὼ τῷ ὀρθῷ περιφερομένη ὀρθογωνία Θ ἔσται κῶν Θ , εἰάν ᾖ ἐλάττων, ἀμβλυγωνία Θ , εἰάν δὲ μείζων, ὀξυγωνία.

Ἀξων δὲ Θ κῶν ἐσὶν, ἡ μένεται ὡς ἰὼ τὸ τρίγωνον σρέφεται.

Βάσις δὲ ὁ κύκλος Θ ὁ ὑπὸ τῆς περιφερομένης θεῖας γραφομένης.

Κύλινδρος Θ δὲ, ὅταν ὀρθογωνία παραλληλογράμ-

λογράμ-

culus circumducitur, donec in eundem restituetur locum vnde cœperat moueri.

Axis sphaeræ est linea recta fixa manens circa quam semicirculus voluitur.

Centrum verò sphaeræ est illud ipsum quod & semicirculi.

Diameter sphaeræ est linea recta per centrum ducta, quæ terminatur ex vtraque parte sphaeræ circumferentia.

Conus est figura solida quæ fit quando manente alicuius trianguli rectanguli latere vno ex ijs quæ angulum continent rectum ipso triangulus circumducitur & restituitur in locum vnde cœperat moueri, quod si igitur linea recta manens fuerit æqualis, reliquo lateri circumducto & angulum rectum continenti tum conus erit rectangulus, si verò minor, amblygonius, si denique maior oxygonius.

Axis conici est recta illa manens circa quam voluitur triangulus.

Basis eius circulus qui describitur per lineam rectam quæ circumducitur.

Cylindrus est figura solida, quæ fit quan-

L v do

λογράμμω μινύσης μιᾶς πλῆρᾶς τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν περιεχθὲν τὸ παραλληλόγραμμον, εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν διποκατασθῆ ὅθεν ἤρξατο φερέσθαι, τὸ πείληφθὲν σχῆμα.

Αἷων δὲ ἕκαστος κύλινδρος ἐστὶν ἡ μένισσα σφαιρῶν περὶ τὴν πλῆρᾶς παραλληλόγραμμον σφύρεται.

Βάσις ἡ οἱ κύκλοι οἱ ὑπὸ τῶν ἀπεναντίων περιεχομένων δύο πλῆρῶν γραφόμενοι.

Ὁμοιοκῶνοι, καὶ κύλινδροι εἰσὶν ὧν οἱ τε ἄξωνες, καὶ αἱ διαμέτροι τῶν βάσεων ἀνάλογον εἰσὶν.

Κύβος ἐστὶ σχῆμα σφαιρῶν ὑπὸ ἑξ τετραγώνων ἴσων περιεχόμενον.

Τετραέδρον ἐστὶ σχῆμα ὑπὸ τετάρων τριγώνων ἴσων, καὶ ἰσοπλῆρῶν περιεχόμενον.

Ὀκταέδρον ἐστὶ σχῆμα σφαιρῶν ὑπὸ ὀκτώ τριγώνων ἴσων, καὶ ἰσοπλῆρῶν περιεχόμενον.

Δωδεκάεδρον ἐστὶ σχῆμα σφαιρῶν ὑπὸ δώδεκα πενταγώνων ἴσων καὶ ἰσοπλῆρῶν, καὶ ἰσογωνίων περιεχόμενον.

do parallelogrammi alicuius reſtangiuli vno ex lateribus quæ angulum continent reſtum manente, ipſum parallelogrammon circunducitur, donec in eundem reſtituatur locum vnde cæperat moueri.

Axis cylindri eſt linea reſta quæ immobilis permanet, & circa quam ipſum vertitur parallelogrammon.

Baſis verò circuli illi qui deſcribuntur à duobus oppoſitis lateribus, quæ circumuoluuntur.

Similes conũ & cylindri ſunt, quorum & axes & diametri, baſiũ proportionales ſunt.

Cubus eſt figura ſolida ſex æqualibus quadratis contenta.

Tetraedron eſt figura ſolida quæ quatuor triangulis æqualibus & æqualium laterum exiſtentibus continetur.

Octaedron eſt figura ſolida quæ octo triangulis æqualibus, & æqualium laterum exiſtentibus continetur.

Dodecaedron eſt figura ſolida duodecim pentagonis æqualibus & æqualium laterum & angulorum æqualium continetur.

Ειχοσάεδρον ἐστὶ γῆμα σφαιρὸν ὑπὸ ἑκο-
σιν τριγώνων ἴσων καὶ ἰσοπλευρῶν περιεχο-
μένον.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Πρότασις α. θεώρημα.

Εὐθείας γραμμῆς μέρ[⊙] μέντοι σὺκίεσιν
ἐν τῷ ὑποκείμενῳ ἑπιπέδῳ, μέρ[⊙] δέ τι ἐν
τῷ μετεώρῳ.

Πρότασις β. θεώρημα.

Εὰν δύο εὐθείαι τέμνωσιν ἀλλήλας, ἐν ἐ-
νὶ εἰσὶν ἑπιπέδῳ, καὶ πᾶν τρίγωνον ἐν ἐνὶ ἐ-
στὶ ἐπιπέδῳ.

Πρότασις γ. θεώρημα.

Εὰν δύο ἑπιπέδα τέμνη ἀλλήλα, ἡ κοινὴ
αὐτῶν ἰσὴ εὐθεῖα ἐστί.

Πρότασις δ. θεώρημα.

Εὰν εὐθεῖα δύο εὐθείαις τεμνέσθαι ἀλλή-
λας πρὸς ὀρθὰς ἑπὶ τῆς κοινῆς ἰσῆς ἑπιστα-
θῆ, ἔ τῷ δὲ αὐτῶν ἑπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ἔσται.

Πρότασις ε. πρόβλημα.

Εὰν εὐθεῖα τρισὶν ταῖς εὐθείαις ἀπινομέ-
ναις ἀλλήλων πρὸς ὀρθὰς ἑπὶ τῇ κοινῆς ἰσῆς
ἑπισταθῆ, αἱ τρεῖς εὐθεῖαι ἐν ἐνὶ εἰσὶν ἑπιπέ-
δῳ.

Πρό-

Ecofaedron est figura solida quæ viginti triangulis equalibus & æqualium laterum continetur.

Propositiones.

Propositio 1. Theorema.

Pars alicuius lineæ non erit in plano subiecto & eiusdem alia pars in sublimi.

Propositio 2. Theorema.

Si duæ rectæ lineæ sese secant erunt illæ in eodem plano, & omnis triangulus in vno est plano.

Propositio 3. Theorema.

Si duo plana sese mutuo secant communi illorum sectio est linea recta.

Propositio 4. Theorema.

Si recta linea duabus rectis sese mutuò secantibus fuerit ad angulos rectos ducta, et ad communem intersectionem cõstituta: erit etiam ei plano ad angulos rectos cõstituta, quod per ipsos ducitur.

Propositio 5. Theorema.

Si recta linea tribus rectis sese mutuò tangentibus ad angulos rectos in communi sectione fuerit constituta: illæ tres lineæ rectæ in vno eodemq; sunt plano.

Propo-

Πρότασις ε. Θεώρημα.

Εὰν δύο εὐθεῖαι ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ὡσι, παράλληλοι ἔσονται αἱ εὐθεῖαι.

Πρότασις ζ. Θεώρημα.

Εὰν ὡσι δύο εὐθεῖαι παράλληλοι ληφθῆ δὲ ἐφ' ἐκατέρας αὐτῶν τυχόντα σημεῖα: ἢ ἴπὶ τὰ σημεῖα ἴπὶ ζυγυμένη εὐθεῖα, ἐν τῷ αὐτῷ ἴπὶπέδῳ ἐστὶ ταῖς παραλλήλοις.

Πρότασις η. Θεώρημα.

Εὰν ὡσι δύο εὐθεῖαι παράλληλοι, ἢ δὲ ἑτέρα αὐτῶν ἐπιπέδῳ πῖνι πρὸς ὀρθὰς ἢ, καὶ ἡ λοιπὴ τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ἔσται.

Πρότασις θ. Θεώρημα.

Αἱ τῆ αὐτῆ εὐθεῖα παράλληλοι, καὶ μὴ ἴσαι αὐτῆ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ: καὶ ἀλλήλαις εἰσι παράλληλοι.

Πρότασις ι. Θεώρημα.

Εὰν δύο εὐθεῖαι ἀπὸ μέρους ἀλλήλων, πῖρι δύο εὐθείας ἀπὸ μέρους ἀλλήλων ὡσι, μὴ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ, ἴσας γωνίας περιέξωσι.

Πρό-

Propositio 6. Theorema.

Si duæ lineæ rectæ in eodem plano ad angulos rectos fuerint constitutæ: illæ rectæ æquedistantes inter se erunt.

Propositio 7. Theorema.

Si fuerint duæ lineæ rectæ æquedistantes: sumantur autem in vtraq; illarum quæuis puncta: recta quæ duo ista puncta coniungit in eodem plano est cū lineis æquedistantibus.

Propositio 8. Theorema.

Si duæ lineæ rectæ æquedistantes fuerint, & altera illarum, alicui plano ad angulos rectos fuerit: etiam reliqua eidem plano ad angulos rectos erit.

Propositio 9. Theorema.

Quæ eidem lineæ rectæ æquedistantes sunt, & non fuerint cum ipsa in eodem plano: etiã inter se æquedistantes erunt.

Propositio 10. Theorema.

Si duæ lineæ rectæ sese mutuò tangentes fuerint positæ ad duas lineas sese mutuò tangentes non in eodem plano: æquales continebunt angulos.

Pro-

Πρότασις ια. πρόβλημα.

Απὸ τῆς δοθέντος σημείας μετεώρου ἑπιπέδου, κάθετον εὐθείαν γραμμὴν ἀγαγεῖν.

Πρότασις ιβ. πρόβλημα.

Τῷ δοθέντι ἐπιπέδῳ, ἀπὸ τῆς πρὸς αὐτῷ δοθέντος σημείας, πρὸς ὀρθὰς εὐθείαν γραμμὴν ἀναστήσει.

Πρότασις ιγ. πρόβλημα.

Τῷ δοθέντι ἐπιπέδῳ, ἀπὸ τῆς πρὸς αὐτῷ σημείας, * δύο εὐθείαι πρὸς ὀρθὰς εὐκ' ἀναστήσονται ἑπὶ τὰ αὐτὰ μέρη.

* *Aliter*, ἀπὸ τῆς αὐτῆς σημείου τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ.

Πρότασις ιδ. θεώρημα.

Πρὸς ἃ ἐπίπεδα ἢ αὐτῇ εὐθείᾳ ὀρθῆ ἐστὶ, παράλληλα ἐστὶ τὰ ἐπίπεδα.

Πρότασις ιε. θεώρημα.

Εὰν δύο εὐθείαι ἀπιόμεναι ἀλλήλων, περὶ δύο εὐθείας ἀπιόμενας ἀλλήλων ὥσι, μὴ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ ᾗσαι, παράλληλα ἐστὶ τὰ δι' αὐτῶν ἑπίπεδα.

Πρότασις ις. θεώρημα.

Εὰν δύο ἑπίπεδα παράλληλα ἔσῃ ἐπιπέδων

Propositio 11. problema.

A dato puncto in sublimi existente ad subiectum planum perpendicularem lineam rectam ducere.

Propositio 12. Problema.

Dato plano à puncto quod in eo est lineam rectam ad angulos rectos ductam erigere.

Propositio 13. problema.

*Dato plano à puncto quod in eo est * duæ rectæ lineæ ad angulos rectos nõ erigentur in easdem partes.*

* *Aliter ab eodem puncto eidem plano.*

Propositio 14. Theorema.

Ad quæcunq; plana eadem linea recta, est recta seu ad angulos rectos ducta: ea plana inter se æquedistantia sunt.

Propositio 15. Theorema.

Si duæ rectæ sese mutuò tangentes, fuerint ad duas alias sese mutuo tangentes, non fuerint etiam in eodem plano, plana quæ per ipsa ducuntur sunt æquedistantia.

Propositio 16. Theorema.

Si duo plana æquedistantia aliud quoddã

M *pla-*

πέδω πινός τέμνηται, αἱ κεινὰ αὐτῶν τομαὶ παράλληλοι εἰσὶ.

Πρότασις ιζ. Θεώρημα.

Εὰν δύο εὐθεῖαι ὑπὸ παραλλήλων ἑπιπέδων τέμνωνται, εἰς τὰς αὐτὰς λόγους τμηθήσονται.

πρότασις ιη. Θεώρημα.

Εὰν εὐθεῖα ἐπιπέδῳ πινὶ πρὸς ὀρθὰς ἦ, καὶ πάντα τὰ δι' αὐτῆς ἑπίπεδα τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ἔσται.

πρότασις ιθ. Θεώρημα.

Εὰν δύο ἑπίπεδα τέμνωνται ἄλληλα ἐπιπέδῳ πινὶ πρὸς ὀρθὰς ἦ, καὶ ἡ κεινὴ αὐτῶν τομὴ τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ἔσται.

Πρότασις κ. Θεώρημα.

Εὰν σφραγῆ γωνία, ὑπὸ τριῶν γωνιῶν ἐπιπέδων περιέχεται δύο ὁποιαῦν τῆς λοιπῆς μείζονες εἰσὶ πάντῃ μεταλαμβανόμενα.

Πρότασις κα. Θεώρημα.

Ἀπασα σφραγῆ γωνία ὑπὸ ἑλασσόνων ἢ τεσσάρων ὀρθῶν γωνιῶν ἐπιπέδων περιέχεται.

Πρότασις κβ. Θεώρημα.

Εὰν

planum secet: communes eorum sectiones æquedistantes sunt.

Propositio 17. Theorema.

Si duas rectas secant duo plana æquedistantia in easdem illas secabunt rationes.

Propositio 18. Theorema.

Si recta quædam cuidam plano fuerit ad angulos rectos constituta: etiam omnia plana quæ per ipsa ducuntur, eidem plano ad angulos rectos erunt.

Propositio 19. Theorema.

Si duo plana sese mutuò secantia cuidam plano fuerint ad angulos rectos constituta: etiam communis illorum sectio, eidem plano, ad angulos rectos erit constituta.

Propositio 20. Theorema.

Si angulus solidus tribus angulis planis continetur, duo ex illis quicunq; fuerint, maiores sunt reliquo, quocunq; sumantur modo.

Propositio 21. Theorema.

Omnis angulus solidus, continetur paucioribus quàm quatuor planis, ijsq; rectis angulis.

Propositio 22. problema.

Εὰν ὡς τρεῖς γωνία ἑπίπεδοι ὧν αἱ δύο τῆς λοιπῆς μείζονες εἰσὶ πάνη μετалаμβανόμενα, περιέχωσι δὲ αὐτὰς ἴσα εὐθεῖα διωατὸν ἐστὶν ἐκ τῶν ἐπιζευγνυσῶν τὰς ἴσας εὐθείας τρίγωνον συστήσασθαι.

Πρότασις κγ. πρόβλημα.

Εκ τριῶν γωνιῶν ἐπιπέδων, ὧν αἱ δύο τῆς λοιπῆς μείζονες εἰσὶ πάνη μετалаμβανόμενα, σερεῖν γωνίαν συστήσασθαι: δεῖ δὴ τὰς τρεῖς πεσάρων ὀρθῶν ἐλάσσονας εἶναι.

Πρότασις κδ. θεώρημα.

Εὰν σερεῶν ὑπὸ παραλλήλων ἐπιπέδων πεείχηται, τὰ ἀπεναντίον αὐτῶν ἑπίπεδα, ἴσα τε καὶ παραλληλόγραμμα ἐστὶ.

Πρότασις κε. θεώρημα.

Εὰν σερεὸν παραλληλεπίπεδον ἐπιπέδω τμηθῆ παραλλήλῳ ὄντι τοῖς ἀπ' ἐναντίον ἐπιπέδοις, ἔσται ὡς ἡ βᾶσις πρὸς τὴν ἐάνσιν, ἔτω τὸ σερεὸν πρὸς τὸ σερεὸν.

Πρότασις κς. θεώρημα.

Πρὸς τῆ δοθείση εὐθεία, καὶ τῶ πρὸς αὐτῆ σημείῳ τῆ δοθείση σερεῖν γωνία, ἴσῳ σερεῖν γωνίαν συστήσασθαι.

πρό-

Si fuerint tres anguli plani, quorum duo maiores sunt reliquo, quouis modo sumpti: eosq; contineant rectæ æquales: constitui potest triangulus ex rectis, quæ illas rectas æquales coniungunt.

Propositio 23. problema.

Ex tribus angulis planis, quorū duo maiores sunt reliquo, quocunq; sumantur modo, angulum solidum constituere, oportet verò illos tres, quatuor rectis minores esse.

Propositio 24. Theorema.

Si solidum aliquod continetur planis æquedistantibus: plana opposita huic solido æqualia & parallelogramma sunt.

Propositio 25. Theorema.

Si solidum parallelepipedon plano secetur quod æquedistat planis oppositis: erit vt basis ab basin, sic solidum ad solidum.

Propositio 26. Problema.

Ad datā rectam & ad datum in ea punctum dato angulo solido, æqualem angulum solidum constituere.

Propositio 27. Problema.

Πρότασις κζ. πρόβλημα.

Απὸ τῆς δοθείσης ευθείας, τῷ δοθέντι σερεῶ παραλληλεπίπедω, ὁμοίον τε ἑομοίως κείμνον σερεὸν παραλληλεπίπεδον ἀναρῆσαι.

Πρότασις κη. Θεώρημα.

Εὰν σερεὸν παραλληλεπίπεδον, ἐπιπέδω τμηθῆ, κατὰ τὰς διαγωνίας τῶν ἀπ' ἐναντίον ἐπιπέδων, δίχα τμηθήσεται τὸ σερεὸν ὑπὸ τῷ ἐπιπέδῳ.

Πρότασις κθ. Θεώρημα.

Τὰ ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως ὄντα σερεὰ παραλληλεπίπεδα, καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὑψῶν αἰ ἐφεσῶσται ἐπὶ τῶν αὐτῶν εἰσὶν ἑυκταῖ, ἴσα ἀλλήλοις εἰσιν.

Πρότασις λ. Θεώρημα.

Τὰ ἔπι τῆς αὐτῆς βάσεως ὄντα σερεὰ παραλληλεπίπεδα, καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὑψῶν αἰ ἐφεσῶσται οὐκ εἰσὶν ἔπι τῶν αὐτῶν εὐθειῶν, ἴσα ἀλλήλοις εἰσιν.

Πρότασις λα. Θεώρημα.

Τὰ ἔπι ἴσων βάσεων ὄντα σερεὰ παραλληλεπίπεδα καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὑψῶν, ἴσα ἀλλήλοις εἰσιν.

A data linea recta dato solido parallelepipedo simile & similiter positum solidum parallelepipedon describere.

Propositio 28. Theorema.

Si solidum parallelepipedon plano aliquo secetur, tum & illud ipsum solidum secabitur in duas æquales partes à plano per lineas diagonales eorum planorum quæ opposita sunt.

Propositio 29. Theorema.

Solida parallelepipeda quæ super eadem basi sunt constituta: & sub eadem altitudine, quorum lineæ erectæ vel cõstitutæ in eisdem sunt lineis rectis: illa inter se sunt æqualia.

Propositio 30. Theorema.

Solida parallelepipeda super eadem basi constituta, & sub eadem altitudine, quorum lineæ constitutæ, non sunt in eisdem lineis rectis, æqualia inter se sunt.

Propositio 31. Theorema.

Solida parallelepipeda super basibus æqualibus constituta, & sub eadem altitudine illa sunt æqualia inter se.

Πρότασις λβ. Θεώρημα.

Τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ὄντα σερεὰ παραλληλεπίπεδα πρὸς ἄλληλα εἰσὶν ὡς αἰβάσεις.

Πρότασις λγ. Θεώρημα.

Τὰ ὅμοια σερεὰ παραλληλεπίπεδα πρὸς ἄλληλα ἐν τριπλασίονι λόγῳ εἰσὶ τῶν ὁμολόγων πλάτων.

Πρότασις λδ. Θεώρημα.

Τῶν ἴσων σερεῶν παραλληλεπιπέδων ἀντιπεπόνθασιν αἰβάσεις τοῖς ὕψεσι: Καὶ ὧν σερεῶν παραλληλεπιπέδων ἀντιπεπόνθασιν αἰβάσεις τοῖς ὕψεσιν, ἴσα εἰσὶν ἐκείνα.

Πρότασις λε. Θεώρημα.

Εὰν ᾧσι δύο γωνίαι ἐπίπεδοι ἴσασιν, ἐπὶ δὲ τῶν κορυφῶν αὐτῶν μετέωροι εὐθεῖαι ἐπιθεθῶσιν, ἴσας γωνίας περιέχουσαι, μὲν τῶν ἐξ ἀρχῆς εὐθεῶν ἐκάτεραν ἐκατέρα, ἐπὶ δὲ τῶν μετεώρων ληφθῆ τυχόντα σημεῖα, καὶ ἀπ' αὐτῶν ἐπὶ τὰ ἐπίπεδα ἐν οἷς εἰσὶν αἱ ἐξ ἀρχῆς γωνίαι κάθετοι ἀχθῶσιν ἀπὸ δὲ τῶν γνομένων σημεῖων ὑπὸ τῶν καθέτων ἐπὶ τοῖς ἐπιπέδοις, ἐπιτήσιν ἐξ ἀρχῆς γωνίας ἐπιζωχθῶσιν.

Propositio 32. Theorema.

Solida parallelepipeda sub eadem altitudine constituta: sese habent vt ipsæ bases.

Propositio 33. Theorema.

Similia solida parallelepipeda sese habent in ratione homologorum laterum triplicata.

Propositio 34. Theorema.

Æqualium solidorum parallelepipedorū reciproca sunt bases altitudinibus. Et quorum solidorum parallelepipedorum reciproca sunt bases altitudinibus illa æqualia inter se sunt.

Propositio 35. Theorema.

Si fuerint duo anguli plani æquales, & in illorum verticibus sublimes constituentur lineæ rectæ, continentes cum lineis ab initio propositis angulos æquales alterum alteri: & in lineis sublimioribus sumantur quævis puncta, à quibus ad plana, in quibus sunt anguli ab initio positi, ducantur perpendiculares: deniq; à iam factis punctis per ipsas perpendiculares in planis ad angulos, ab initio propositos ductæ fuerint lineæ rectæ: illæ cum

M v lineis

χθῶσιν εὐθεῖαι, ἴσας γωνίας περιέξουσιν
τῶν μετρώρων.

Πρότασις λς. Θεώρημα.

Εὰν τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον ὡσι, τὸ ἑκ
τῶν τριῶν σερῶν παραλληλεπίπεδο ἴσον
ἔσιν τῷ ἀπὸ τῆς μέσης σερῶ παραλληλεπι-
πέδῳ ἰσοπλευρῷ μὲν ἰσογωνίῳ δὲ τῷ περι-
ερισμένῳ.

Πρότασις λζ. Θεώρημα.

Εὰν τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον ὡσι, καὶ
τὰ ἀπ' αὐτῶν παραλληλεπίπεδα, ὁμοιά τε
καὶ ὁμοίως ἀναγραφοῦντα ἀνάλογον ἔσται, καὶ
εὰν τὰ ἀπ' αὐτῶν σερῶ παραλληλεπίπε-
δα ὁμοιά τε, καὶ ὁμοίως ἀναγραφοῦντα ἀνά-
λογον ἦ, ἔσται αὐταὶ εὐθεῖαι ἀνάλογον ἔσονται.

Πρότασις λη. Θεώρημα.

Εὰν ἄρα ἐπίπεδον πρὸς ἐπίπεδον ὀρθὸν ἦ,
καὶ ἀπὸ τινος σημείου τῶν ἐν ἐνὶ τῶν ἐπιπέ-
δων ἐπὶ τὸ ἕτερον ἐπίπεδον κάθηται ἀκτῆς
ἐπὶ τῆς κοινῆς τομῆς πεσεῖται τῶν ἐπιπέδων
ἢ ἀγομένη κάθηται.

Πρότασις λθ. Θεώρημα.

Εὰν σερῶ παραλληλεπίπεδα τῶν ἀπ' αὐ-
τῶν

lineis sublimioribus æquales angulos continent.

Propositio 36. Theorema.

Si tres lineæ rectæ fuerint proportionales solidum parallelepipedon quod ex illis tribus rectis fit, est æquale solido parallelepipedo æquilatero quod describitur à linea media & æquales angulos habenti cum præcedente.

Propositio 37. Theorema.

Si quatuor rectæ proportionales fuerint, etiam parallelepipeda similia & similiter descripta proportionalia erunt. & si solida parallelepipeda similia & similiter descripta proportionalia fuerint, etiam ipsæ lineæ rectæ proportionales erunt.

Propositio 38. Theorema.

Si planum aliquod ad aliud planum fuerit erectum, & à puncto aliquo quod in altero planorum est ad alterum planum ducatur perpendicularis: illa cadet in communem planorum sectionem.

Propositio 39. Theorema.

Si solidi parallelepipedi latera planorum opposi-

ἐναντίον ἐπιπέδων αἰ πλωραὶ δίχα τμηθῶσι, Διά δὲ τῶν τομῶν ἐπίπεδα ἐκβληθῆ, ἢ κοινὴ τομὴ τῶν ἐπιπέδων, καὶ ἡ τῷ σερεῦ παραλληλεπίπεδα Διάμετρος \odot δίχα τέμνουν ἀλλήλας.

Πρότασις μ. Θεώρημα.

Εὰν ἡ δύο πρίσματα ἰσοῦψῆ, καὶ τὸ μὲν ἔχῃ βάσιν παραλληλόγραμμον, τὸ δὲ τρίγωνον διπλάσιον δὲ ἢ τὸ παραλληλόγραμμον τῷ τριγώνῳ, ἴσα ἔσται τὰ πρίσματα.

Τέλος \odot τῷ ἰᾷ στοιχείῳ.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Β.

καὶ σερεῶν β.

Πρότασις α. Θεώρημα.

ΤΑ ἐν τοῖς κύκλοις ὅμοια πολύγωνα πρὸς ἀλλήλα ἔσιν ὡς τὰ ἀπὸ τῶν Διάμετρων τετράγωνα.

πρότασις β. Θεώρημα.

Οἱ κύκλοι πρὸς ἀλλήλας ἔσιν ὡς τὰ ἀπὸ τῶν Διάμετρων τετράγωνα.

Πρότα-

oppositorum fuerint secta in duas partes æquales: & per ipsas sectiones ducantur plana: communis planorum sectio, & diameter solidi parallelepipedo sese mutuò secant in duas partes æquales.

Propositio 40. Theorema.

Si fuerint duo prismata eiusdem altitudinis, quorum alterum basin habeat parallelogrammon: alterum verò triangulum atq; parallelogrammon sit trianguli duplum: illa duo prismata æqualia sunt.

Finis Libri Vndecimi.

EVCLIDIS LIBER DVODE-
CIMVS ELEMENTORVM ET
Stereometriæ primus.

Propositio 1. Theorema.

Polygona similia quæ in circulis sunt ad sese mutuò habent, vt quadrata quæ à diametris describuntur.

Propositio 2. Theorema.

Circuli ita sese mutuò habent, vt quadrata quæ à diametris describuntur.

πρότασις γ. θεώρημα.

Πᾶσα πύραμις τριγώνου ἔχουσα βάσιν, διαιρεῖται εἰς δύο πυραμίδας ἴσας τε καὶ ὁμοίας ἀλλήλαις τριγώνου βάσις ἔχουσαι, καὶ ὁμοίως τῆ ὅλη, καὶ εἰς δύο πρίσματα ἴσα, καὶ τὰ δύο πρίσματα μείζονα εἰσὶν ἢ τὸ ἥμισυ τῆ ὅλης πυραμίδος.

Πρότασις δ. θεώρημα.

Εὰν ὡς δύο πυραμίδες ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὑψὸς τριγώνου ἔχουσα βάσις: διαιρεθῆ δὲ ἑκατέρα αὐτῶν εἰς τε δύο πυραμίδας ἴσας ἀλλήλαις, καὶ ὁμοίως τῆ ὅλη, καὶ εἰς δύο πρίσματα ἴσα, καὶ τῶν γενομένων πυραμίδων ἑκατέρα τὸν αὐτὸν τρόπον, καὶ τοῦτο αἰεὶ γίνηται, εἰσὶν ὡς ἡ τῆς μιᾶς πυραμίδος βάσις, πρὸς πλὴν τῆς ἑτέρας πυραμίδος βάσιν: ἔτι καὶ τὰ ἐν τῇ μιᾷ πυραμίδι πρίσματα πάντα, πρὸς τὰ ἐν τῇ ἑτέρᾳ πυραμίδι πρίσματα πάντα ἴσοι πληθῆ.

Πρότασις ε. θεώρημα.

Αἱ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὑψὸς ἔσαι πυραμίδες καὶ τριγώνου ἔχουσα βάσις, πρὸς ἀλλήλας εἰσὶν, ὡς αἱ βάσις.

Πρότασις ς. θεώρημα.

Propositio 3. Theorema.

Omnis pyramis quæ basin habet triangularem diuiditur in duas pyramides æquales, & similes inter se habentes bases triangulares, & similiter toti: atq; duo prismata æqualia, & duo illa prismata maiora sunt quàm dimidium totius pyramidis.

Propositio 4. Theorema.

Si fuerint duæ pyramides eiusdem altitudinis, habentes bases triangulares, utraq; diuidetur in duas pyramides æquales inter se, & similes toti atq; duo prismata æqualia, & ex iam factis pyramidibus utraq; eodem modo diuidetur, & illud semper fiat: erit ut vnius pyramidis basis ad alterius pyramidis basin, sic omnia prismata quæ in vna pyramide sunt ad omnia prismata æqualia numero alterius pyramidis.

Propositio 5. Theorema.

Pyramides quæ eiusdem sunt altitudinis & bases habent triangulares, ita se habent ut bases.

Propositio 6. Theorema.

Pyra-

Αἱ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος πυραμίδες,
καὶ πολυγώνους ἔχουσι βάσις πρὸς ἀλλήλας
εἰσὶν ὡς αἱ βάσις.

Πρότασις ζ. Θεώρημα.

Πᾶν πρίσμα τρίγωνον ἔχον βάσιν, δια-
ρεῖται εἰς τρεῖς πυραμίδας ἴσας ἀλλήλαις
τρίγώνους βάσις ἔχουσας.

Πρότασις η̄. πρόβλημα.

Αἱ ὅμοιαι πυραμίδες καὶ τρίγώνους ἔχου-
σι βάσις, ἐν τριπλασίονι λόγῳ εἰσὶ τῶν ὁ-
μολόγων πλῆθῶν.

Πρότασις θ. Θεώρημα.

Τῶν ἴσων πυραμίδων, καὶ τρίγώνους βάσις
ἔχουσῶν ἀντιπεπόνθασιν, αἱ βάσις τοῖς ὕψε-
σι: Ἐῶν πυραμίδων τρίγώνους βάσις ἔχου-
σῶν ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσις τοῖς ὕψεσι,
ἴσαι εἰσὶν ἐκεῖναι.

Πρότασις ι. Θεώρημα.

Πᾶς κῶν κύλινδρος τρίτον μέρος ἐστὶ
τοῦ πρὸς αὐτῷ βάσιν ἔχοντος αὐτῷ, καὶ ὕ-
ψος ἴσον.

Πρότασις ια. Θεώρημα.

Οἱ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ὄντες κῶνοι καὶ
κύλινδροι, πρὸς ἀλλήλας εἰσὶν, ὡς αἱ βάσις.

Pyramides quæ eiusdē sunt altitudinis et polygonas habēt bases, ita se habēt vt bases.

Propositio 7. Theorema.

Omne prisma triangularem habens basin diuiditur in tres pyramides inter se æquales, habentes bases triangulares.

Propositio 8. Theorema.

Pyramides similes & triangulares bases habentes, proportionem laterum homologorum habent triplicatam.

Propositio 9. Theorema.

Pyramidum æqualium, & triangulares bases habentium, reciproca sunt bases altitudinibus, & quorum pyramidum triangulares bases habentium reciproca sunt bases ipsis altitudinibus, illæ sunt æquales.

Propositio 10. Theorema.

Omnis conus, tertia cylindri pars est eius, nempe cum quo eandem basin habet & altitudinem æqualem.

Propositio 11. Theorema.

Coni & Cylindri qui sub eadem sunt altitudine, sese mutuò habent, vt ipsa bases.

N Pro-

Πρότασις ιβ. Θεώρημα.

Οἱ ὅμοιοι κῶνοι, καὶ κύλινδροι ἐν τριπλασίοις λόγῳ εἰσὶν τῶν ἐν ταῖς βάσεσι διπλασίων. Πρότασις ιγ. Θεώρημα.

Εὰν κύλινδρον ἐπιπέδῳ τμηθῆ παραλλήλῳ, ὅντι τοῖς ἀπ' ἐναντίον ἐπιπέδοις, ἕσται ὡς ὁ κύλινδρος πρὸς τὸν κύλινδρον ὁ ἄξων πρὸς τὸν ἄξονα.

Πρότασις ιδ. Θεώρημα.

Οἱ ἐπὶ ἴσων βάσεων ὄντες κῶνοι καὶ κύλινδροι, πρὸς ἀλλήλους εἰσὶν ὡς τὰ ὕψη.

Πρότασις ιε. Θεώρημα.

Τῶν ἴσων κῶνων καὶ κυλίνδρων, ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσεις τοῖς ὕψεσι, καὶ ὧν κῶνων, καὶ κυλίνδρων ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσεις τοῖς ὕψεσιν ἴσοι εἰσὶν ἐκείνοι.

Πρότασις ις. Πρόβλημα.

Δύο κύκλων πρὸς τὸ αὐτὸ κέντρον ὄντων εἰς τὸν μείζονα κύκλον πολύγωνον ἰσοπλευρόν τε ἀρτιόπλευρον ἐγγράψαι, μὴ ψαῦσεν ἑλάσσον κύκλον.

Πρότασις ιζ. Πρόβλημα.

Δύο σφαιρῶν πρὸς τὸ αὐτὸ κέντρον ἔσῶν εἰς τὴν

Propositio 12. Theorema.

Similes conī, & cylindri triplicatam habent diametrorū quæ in basibus sunt rationē.

Propositio 13. Theorema.

Si cylindrus plano fuerit sectus æquedistanti planis oppositis, erit ut cylindrus ad cylindrum, ita axis ad axem.

Propositio 14. Theorema.

Coni & Cylindri habentes bases æquales sese mutuò habent ut altitudines.

Propositio 15. Theorema.

Æqualium conorum & cylindrorum reciproca sunt bases altitudinibus, & quorum conorum atq; cylindrorum reciproca sunt bases altitudinibus illi æquales sunt.

Propositio 16. problema.

Datis duobus circulis qui æque eodem centro descripti sunt, in maiorem circulum polygonon æquilaterum & parium laterum inscribere, quod minorem circulum nō tangat.

Propositio 17. problema.

Datis duabus sphaeris ex vno eodemq; centro descriptis in sphaeram maiorem inscribere.

εἰς τὴν μείζονα σφαιραν σφαιρὸν πλύγωνον ἐγγράψαι, μὴ ψαῦον τῆς ἐλάσσονος σφαιρας κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν.

Πρότασις ιη. Θεώρημα.

Αἱ σφαιραὶ πρὸς ἀλλήλας ἐν τριπλασίονι λόγῳ εἰσὶ τῶν ἰδίων διαμέτρων.

Τέλος τῆς β' συλλογῆς.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ιγ, καὶ σφαιρῶν τρίτον.

Πρότασις α. Θεώρημα.

Εὰν εὐθεῖα γραμμὴ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῇ, τὸ μείζον τμήμα πρὸς τὸν ἡμισείαν τῆς ὅλης πρὸς τὸν ἡμισείαν τῆς ὅλης πρὸς τὸν ἡμισείαν τῆς ὅλης πρὸς τὸν ἡμισείαν τῆς ὅλης.

Πρότασις β. πρόβλημα.

Εὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμήματος ἐαυτῆς πενταπλασίον διώηται τῆς διπλασίας τῆς ἑξημένου τμήματος, ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηνομένης, τὸ μείζον τμήμα τὸ λοιπὸν μέρους εἰς τῆς ἐξ ἀρχῆς εὐθείας.

Πρόπε-

polygonon quod superficiem minoris sphaerae non tangat.

Propositio 18. Theorema.

Sphaera suorum diametrorum rationem habent triplicatam.

Finis Duodecimi Libri.

EVCLIDIS LIBER DECIMVS TERTIVS ET STEREOMETRIA tertius.

Propositio 1. Theorema.

S*I recta linea secta fuerit extrema & media ratione, maius segmentum dimidiam assumens totius partem quintuplo plus potest quam quadratum quod à dimidio totius segmento describitur.*

Propositio 2. Theorema.

Si recta linea quintuplo plus potest sui ipsius segmenti quàm duplum iam dicti segmenti diuisi extrema & media ratione: maius segmentum erit reliqua pars ab initio propositae lineae rectae.

πρώταις γ. Θεώρημα.

Εὰν ὀρθεῖα γραμμὴ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῆ, τὸ ἐλασσον τμήμα προσλαβὼν πρὸ ἡμισείαν τῶ μείζονος τμήματ^ο πεντεπλάσιον διώηται τῶ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τ^ο μείζον^ο τετραγών^ο.

πρώταις δ. Θεώρημα.

Εὰν ὀρθεῖα γραμμὴ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῆ τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης, καὶ τῶ ἐλάττω^ο τμήμα^ο τὰ σωμαφότερα τετράγωνα, τριπλάσια ἐστὶ τῶ ἀπὸ τῶ μείζον^ο τμήματ^ο τετραγών^ο.

Πρώταις ε. Θεώρημα.

Εὰν ὀρθεῖα γραμμὴ, ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῆ, ἢ προστεθῆ, ἴση τῶ μείζονι τμήματι, ὅλη ἢ ὀρθεῖα, ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται, καὶ τὸ μείζον τμήμα ἐστὶν ἢ ἐξ ἀρχῆς ὀρθεῖα.

πρώταις ς. Θεώρημα.

Εὰν ὀρθεῖα ῥητὴ, ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῆ, ἐκάτερον τῶν τμημάτων, ἄλογ^ο ἐστὶν ἢ καλουμένη ἀποτομή.

πρώταις ζ. Θεώρημα.

Εὰν

Propositio 3. Theorema.

Si recta linea extrema & media ratione secetur, minus segmentum verò assumat dimidium maioris segmenti quintuplo plus potest quam quadratum quod à maioris segmenti dimidio describitur.

Propositio 4. Theorema.

Si recta linea extrema & media ratione fuerit secta, quadratum à tota descriptum, et à minore segmento illa duo quadrata tripla sunt quadrati à maiore segmento descripti.

Propositio 5. Theorema.

Si recta linea extrema & media ratione secetur, eiq; apponatur recta maiori segmento æqualis: tota illa recta extrema & media ratione secta erit, & segmentum maius est linea recta ab initio proposita.

Propositio 6. Theorema.

Si recta rationalis extrema & media ratione secetur, utraq; segmentum irrationale est, quod vocatur residuum.

Propositio 7. Theorema.

Εὰν πεντάγωνος ἰσοπλευροῦ αἱ τρεῖς γωνίαι ἦτοι αἱ κατὰ τὸ ἐξῆς, ἢ αἱ μὴ κατὰ τὸ ἐξῆς ἴσαι ᾧσιν, ἰσογώνιον ἔσται τὸ πεντάγωνον.

Πρότασις η̄. Θεώρημα.

Εὰν πεντάγωνος ἰσοπλευρὸς καὶ ἰσογωνίου τὰς κατὰ τὸ ἐξῆς δύο γωνίας ὑποτείνωσιν εὐθεῖαι, ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέμνουσιν ἀλλήλας, καὶ τὰ μείζονα αὐτῶν τμήματα ἴσα ἐσὶ, τῇ τῷ πεντάγωνος πλευρᾷ.

Πρότασις θ. Θεώρημα.

Εὰν ἡ τῷ ἑξαγώνου πλευρὰ, καὶ ἡ τοῦ δεκαγώνου, εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένων ὑποτεθῶσιν, ἡ ὅλη εὐθεῖα, ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται, καὶ τὸ μείζον αὐτῆς τμήμα ἐστὶν ἡ τῷ ἑξαγώνου πλευρᾷ.

Πρότασις ι. Θεώρημα.

Εὰν εἰς κύκλον πεντάγωνον ἰσόπλευρον ἐγγραφή, ἡ δὲ πεντάγωνος πλευρὰ διώαται, πῶς τε δὲ ἑξαγώνου, καὶ πῶς τῷ δεκαγώνου, τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένων.

Πρότασις ια. Θεώρημα.

Εὰν εἰς κύκλον ῥητῶς ἔχοντα πῶς ἀμέτρον πεντάγωνον ἰσόπλευρον ἐγγραφή, ἡ δὲ

Si alicuius pentagoni tres anguli siue contigui sint, siue non contigui: fuerint inter se æquales, tum illud pentagonõ æqualium erit angulorum.

Propositio 8. Theorema.

Si pentagoni alicuius quod latera habet æqualia, & angulos æquales, angulos duos cõiguos subtendant rectæ: illæ extrema & media ratione sese secant, & maiora illorum segmenta, sunt æqualia lateri ipsius pentagoni.

Propositio 9. Theorema.

Si hēxagoni & decagoni in eundem circuli inscriptorum latera componantur: tota linea recta erit extrema & media ratione secta & maius segmentum est latus hexagoni.

Propositio 10. Theorema.

Si in circulum pentagonon æquilaterum inscribatur, tum pentagoni latus potest latus hexagoni & decagoni quæ in eundem inscripta sunt circulum.

Propositio 11. Theorema.

Si in circulum qui diametron habet rationalem inscribatur pentagonon æquilaterum

N 7 sum

πενταγώνου πλωρὰ ἄλογον ἔστιν ἢ καλυμμένη ἑλαστων.

Πρότασις ιβ. πρόβλημα.

Εὰν εἰς κύκλον τρίγωνον ἰσόπλωρον ἐγγραφῆ, ἢ τῷ τρίγωνου πλωρὰ διωάμει τριπλασίων ἐστὶ τῆς ἐκ τῷ κέντρῳ τῷ κύκλου.

Πρότασις ιγ. πρόβλημα.

Πυραμίδα συστήσασθαι, καὶ σφαῖρα περιλαβεῖν τῇ δοθείσῃ: καὶ δεῖξαι ὅτι ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος διωάμει ἡμισία ἐστὶ τῆς πλωρᾶς τῆς πυραμίδος.

Πρότασις ιδ. πρόβλημα.

Οκτάεδρον συστήσασθαι, καὶ σφαῖρα περιλαβεῖν, ἢ καὶ τῷ πυραμίδα, καὶ δεῖξαι ὅτι ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος διωάμει διπλασία ἐστὶ τῆς πλωρᾶς τῷ οκτάεδρου.

Πρότασις ιε. πρόβλημα.

Κύβον συστήσασθαι καὶ σφαῖρα περιλαβεῖν, ἢ καὶ τὰ πρότερα, καὶ δεῖξαι ὅτι ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος διωάμει τριπλή ἐστὶ τῆς τῷ κύβῳ πλωρᾶς.

Πρότασις ις. πρόβλημα.

Εικοσάεδρον συστήσασθαι, καὶ σφαῖρα περιλαβεῖν

tum pentagoni latus irrationale est, vocatur minor.

Propositio 12. Theorema.

Si in circulum inscribatur triangulus æquilaterus tum trianguli latus potentia triplum est lineæ ex centro circuli ductæ.

Propositio 13. problema.

Pyramidem constituere & spheræ datæ includere, atq; demonstrare quod diameter spheræ potentia sesquialtera est lateris ipsius pyramidis.

Propositio 14. problema.

Octaedron constituere & spheræ includere in qua & pyramidem, atq; demonstrare quod diameter spheræ potentia dupla sit lateris octaedri.

Propositio 15. problema.

Cubum constituere & spheræ ei includere cui & præcedentia, ac demonstrare quod diameter spheræ potentia sit tripla lateris cubici.

Propositio 16. problema.

Eicosædron constituere & spheræ includere

λαβῆν, ἢ καὶ τὰ προσηρημένα σχήματα, καὶ
 δεῖξαι ὅτι ἡ τῷ εἰκοσαέδρῳ πλῆρὰ ἄλογον
 ἐστὶν ἢ καλυμένη ἑλαπίων.

Πρότασις ιζ. πρόβλημα.

Δωδεκαέδρον συστήσασθαι Ἐσφαιρα πε-
 ριλαβῆν ἢ καὶ τὰ προσηρημένα σχήματα, καὶ
 δεῖξαι ὅτι ἡ τῷ δωδεκαέδρῳ πλῆρὰ ἄλο-
 γον ἐστὶν ἢ καλυμένη δόποιομή.

Πρότασις ιη. πρόβλημα.

Τὰς πλῆρὰς τῶν πέντε σχημάτων, ἐπι-
 θέσθαι καὶ συγκρίσασθαι πρὸς ἀλλήλας.

Τέλος τῶν στοιχείων.



dere, cui & præcedentes inclusimus, ac demonstrare quod latus Eicosaedri irrationale sit, quod vocatur minus.

Propositio 17. problema.

Dodecaedron constituere & sphaera circumdare qua & antecedentes figuras ac demonstrare quod dodecaedri latus irrationale sit quod vocatur residuum.

Propositio 18. problema.

Latera quinque horum corporum regularium proponere, & inter se conferre.

Finis Libri Decimicertij.



ERRATA.

In titulo libri secundi *γαμμικῶς* lege *γαμμηκῶς*. In præfatione libri secundi a. 3. linea 14. cognitionem lege cognationem. In præfatione libri secundi facie altera paginæ a. 4. con-genda lege congerenda. Sunt & alia hinc inde errata, quæ certè non poterant omnia obseruari, siquidem non mihi tantum, qui successiuis horis, & quibus ab alijs vacuus videbar mihi esse negotijs, hæc conscripsi: tantum spacij temporis concessum non fuit, vt omnia corrigerẽ ad amussimq; iudicij Geometrici examinarem: sed & ipse Typographus suis ijsq; diuersis distra-ctus negotijs, quæ in Typographia forsitan sunt neglecta, in integrum re-stituere non potuit. Rogamus igitur æquum lectorem, vt *ὑπολοιπέρις* ve-nia detur, præsertim cum offeramus operam nostram, quod in *δωτέριαις* *Φροσίδεσι* longè edituri simus corre-ctiora: nec dubitamus hanc nostram
excusa-

excusationem locū apud eos habituram, qui & nos norunt, & temporis angustiam qua hæc in lucem edi curauimus, respicere volunt. Accedit etiā hoc quod peregrè profectus fuerim, cum extrema manus his libris imponeretur, vt quæ forsan necessariam requirerent emendationem, à me illam habere non potuerint.

FINIS.

